

УДК 615.828+616-008.6
<https://doi.org/10.32885/2220-0975-2023-2-8-90>

© Д. Е. Мохов, В. О. Белаш, И. А. Аптекарь,
Э. Н. Ненашкина, Ю. П. Потехина,
Е. С. Трегубова, А. Ф. Беляев, 2023

Соматическая дисфункция. Клинические рекомендации 2023



Кодирование по Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем: М99.0, М99.8, М99.9
Возрастная группа: взрослые, дети
Год утверждения: 2023
Разработчик клинических рекомендаций: Общероссийская общественная организация содействия развитию остеопатии «Российская остеопатическая ассоциация»
Одобрены научно-практическим советом Министерства здравоохранения Российской Федерации (протокол от 27.12.2022 № 23)
Утверждены правлением Общероссийской общественной организации содействия развитию остеопатии «Российская остеопатическая ассоциация» (протокол от 18.01.2023 №1/23)

Д. Е. Мохов^{1,2,*}, **В. О. Белаш**^{1,6}, **И. А. Аптекарь**^{3,4}, **Э. Н. Ненашкина**^{2,6},
Ю. П. Потехина^{5,6}, **Е. С. Трегубова**^{1,2}, **А. Ф. Беляев**^{7,8}

¹ Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова
191015, Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 41

² Санкт-Петербургский государственный университет
199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 7/9

³ Тюменский институт мануальной медицины
625048, Тюмень, ул. Попова, д. 7а

⁴ Тюменский институт остеопатической медицины
625048, Тюмень, ул. Попова, д. 7а

⁵ Приволжский исследовательский медицинский университет
603005, Нижний Новгород, пл. Минина и Пожарского, д. 10/1

⁶ Институт остеопатии
191024, Санкт-Петербург, ул. Дегтярная, д. 1, лит. А

⁷ Тихоокеанский государственный медицинский университет
690002, Владивосток, пр. Острякова, д. 2

⁸ Приморский институт вертеброневрологии и мануальной медицины
690041 Владивосток, ул. Маковского, д. 53а

Цель — дать современные представления о соматических дисфункциях как потенциально обратимых структурно-функциональных нарушениях в организме человека, диагностике и возможностях их коррекции для врачей-osteопатов.

* Для корреспонденции:

Дмитрий Евгеньевич Мохов

Адрес: 191015 Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 41,
Северо-Западный государственный медицинский
университет им. И. И. Мечникова
E-mail: dmitriy.mohov@szgmu.ru

* For correspondence:

Dmitry E. Mokhov

Address: Mechnikov North-West Medical State
University, bld. 41 ul. Kirochnaya,
Saint-Petersburg, Russia 191015
E-mail: dmitriy.mohov@szgmu.ru

Для цитирования: Мохов Д. Е., Белаш В. О., Аптекарь И. А., Ненашкина Э. Н., Потехина Ю. П., Трегубова Е. С., Беляев А. Ф. Соматическая дисфункция. Клинические рекомендации 2023. Российский остеопатический журнал. 2023; 2: 8–90. <https://doi.org/10.32885/2220-0975-2023-2-8-90>

For citation: Mokhov D. E., Belash V. O., Aptekar I. A., Nenashkina E. N., Potekhina Yu. P., Tregubova E. S., Belyaev A. F. Somatic Dysfunction. Clinical Guidelines 2023. Russian Osteopathic Journal. 2023; 2: 8–90. <https://doi.org/10.32885/2220-0975-2023-2-8-90>

Специфическим объектом остеопатического воздействия является группа пальпируемых феноменов, которые называются соматическими дисфункциями. Соматические дисфункции включены в Международную классификацию болезней, травм и состояний, влияющих на здоровье, 10-го пересмотра (МКБ-10). Соматическая дисфункция (СД) — это потенциально обратимое структурно-функциональное нарушение в тканях и органах, проявляющееся пальпаторно определяемыми ограничениями различных видов движений и подвижности. Обратимость — одна из основных характеристик СД, связанная с возможностью получить эффект изменения/устранения выявленных нарушений в ответ на различные способы остеопатической коррекции. Нарушение подвижности, то есть СД, может иметь несколько компонентов, которые могут сочетаться между собой и иметь разную степень выраженности, — биомеханический, гидродинамический (ритмогенный) и нейродинамический. СД могут проявляться на глобальном, региональном и локальном уровнях, иметь острое или хроническое течение. Ведущая роль в патогенезе формирования СД принадлежит соединительной ткани. На основании анамнестических данных, физикального обследования, а также с помощью алгоритма пальпаторных диагностических приемов врачи-osteопаты определяют взаимное расположение структур тела и их симметричность, а также качественное состояние тканей. Кроме общепринятой формулировки диагноза, заполняется остеопатическое заключение с указанием биомеханических, ритмогенных и нейродинамических нарушений на глобальном, региональном и локальном уровнях, а также указывается доминирующая СД, коррекция которой и будет являться логической конечной целью данного остеопатического сеанса. В соответствии с действующей нормативно-правовой базой врач-osteопат на приеме заполняет бланк «Первичный осмотр врачом-osteопатом» или бланк «Осмотр врачом-osteопатом (наблюдение в динамике)». Данные медицинские документы являются вкладом в Учетную форму № 025/у, утвержденную приказом Минздрава России от 15 декабря 2014 г. № 834н. Восстановление подвижности является целью применения остеопатических лечебных техник и приводит к нормализации функционального состояния тканей. Практика остеопатии заключается в высвобождении элементов костно-мышечной системы, внутренних органов, в восстановлении должного функционирования всех систем организма, включая нервную, кровеносную и лимфатическую. При отсутствии противопоказаний (абсолютных или относительных) схема лечения определяется индивидуально в соответствии с оформленным остеопатическим заключением, при этом определяется количество, характер (вид) техник и последовательность их использования на данном сеансе. Эффективность остеопатической коррекции СД доказана при различных заболеваниях и состояниях, перечень которых также представлен в Рекомендациях.

Заключение. Выполнение клинических рекомендаций может способствовать своевременному установлению диагноза и улучшению качества оказания медицинской помощи пациентам с СД.

Ключевые слова: соматическая дисфункция, компоненты соматической дисфункции (биомеханический, гидродинамический, нейродинамический), уровень проявления соматической дисфункции, остеопатическая диагностика, остеопатическое заключение, доминирующая соматическая дисфункции, остеопатическая коррекция, медицинская документация

Источник финансирования. Исследование не финансировалось каким-либо источником.

Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Статья поступила: 31.01.2023

Статья принята в печать: 31.03.2023

Статья опубликована: 30.06.2023

UDC 615.828+616-008.6
<https://doi.org/10.32885/2220-0975-2023-2-8-90>

© Dmitry E. Mokhov, Vladimir O. Belash,
Igor A. Aptekar, Elvira N. Nenashkina,
Yulia P. Potekhina, Elena S. Tregubova,
Anatoly F. Belyaev, 2023

Somatic Dysfunction. Clinical Guidelines 2023

Coding according to the International Statistical Classification of Diseases
and Related Health Problems: M99.0, M99.8, M99.9

Age group: adults, children

Year of approval: 2023

The developer of the clinical recommendation: All-Russian public organization
for the promotion of osteopathy «Russian Osteopathic Association»

Approved by the Scientific and Practical Council of the Ministry of Health
of the Russian Federation (Protocol № 23 dated December 27, 2022)

Approved by the Board of the All-Russian Public Organization for the Promotion of the Development
of Osteopathy «Russian Osteopathic Association» (Protocol № 1/23 dated January 18, 2023)

Dmitry E. Mokhov^{1,2,*}, **Vladimir O. Belash**^{1,6}, **Igor A. Aptekar**^{3,4}, **Elvira N. Nenashkina**^{2,6},
Yulia P. Potekhina^{5,6}, **Elena S. Tregubova**^{1,2}, **Anatoly F. Belyaev**^{7,8}

¹ Mechnikov North-West Medical State University

bld. 41 ul. Kirochnaya, Saint-Petersburg, Russia 191015

² Saint-Petersburg State University

bld. 7/9 Universitetskaya nab., Saint-Petersburg, Russia 199034

³ Tyumen Institute of Manual Medicine

bld. 7a ul. Popova, Tyumen, Russia 625048

⁴ Tyumen Institute of Osteopathic Medicine

bld. 7a ul. Popova, Tyumen, Russia 625048

⁵ Privolzhsky Research Medical University

bld. 10/1 sq. Minin and Pozharsky, Nizhny Novgorod, Russia 603005

⁶ Institute of Osteopathy

bld. 1A ul. Degtyarnaya, Saint-Petersburg, Russia 191024

⁷ Pacific State Medical University

bld. 2 pr. Ostryakova, Vladivostok, Russia 690002

⁸ Primorsky Institute of Vertebro-neurology and Manual Medicine

bld. 53a ul. Makovskogo, Vladivostok, Russia 690041

The aim is to present for osteopaths the modern ideas about somatic dysfunctions as potentially reversible structural and functional disorders in the human body, and about its diagnostics and the correction possibilities. A specific subject of osteopathic influence is a group of palpable phenomena, which are called somatic dysfunctions. Somatic dysfunctions are included in the International Classification of Diseases, Injuries and Conditions Affecting Health, 10th Revision (ICD-10). Somatic dysfunction (SD) is a potentially reversible structural and functional disorder in tissues and organs, manifested by palpation-determined limitations of various types of movements and mobility. Reversibility is one of the main characteristics of SD, associated with the ability to obtain the effect of changing/eliminating the identified disorders in response to various methods of osteopathic correction. Impaired mobility, that is, SD, can have several components that can be combined with each other and have different degrees of severity — biomechanical, hydrodynamic (rhythmogenic) and neurodynamic. SD can manifest itself at the global, regional and local levels, and can have an acute or chronic character. The leading role in the pathogenesis of SD formation belongs to the connective tissue. Based on anamnestic data, physical examination, as well as using the algorithm of palpation diagnostic techniques, osteopaths determine the relative position of the body structures and their symmetry, as well as the qualitative state of the tissues. In addition to the generally accepted formulation of the diagnosis, an osteopathic conclusion includes the indication of biomechanical, rhythmogenic and neurodynamic disorders at the global, regional and local levels, as well as the

dominant SD, the correction of which will be the logical ultimate goal of the osteopathic session. In accordance with the current regulatory framework, the osteopathic physician at the appointment fills out the form «Primary examination by an osteopathic physician» or the form «Examination by an osteopathic physician (observation in dynamics)». These medical documents are an insert in the Registration Form №025/u, approved by the order of the Ministry of Health of Russia dated December 15, 2014 №834n. The restoration of mobility is the goal of osteopathic treatment techniques applying and leads to the normalization of the functional state of tissues. The practice of osteopathy is to release the elements of the musculoskeletal system, internal organs, to restore the proper functioning of all body systems, including the nervous, circulatory and lymphatic systems. In the absence of contraindications (absolute or relative), the treatment regimen is determined individually in accordance with the issued osteopathic conclusion, including the defining of the number, nature (type) of techniques and the sequence of their use in a given session. The effectiveness of osteopathic correction of SD has been proven for various diseases and conditions, a list of which is also presented in the Recommendations.

Conclusion. The implementation of the Clinical Recommendations can contribute to the timely diagnosis and improve the quality of medical care for patients with SD.

Key words: *somatic dysfunction, components of somatic dysfunction (biomechanical, hydrodynamic, neurodynamic), level of manifestation of somatic dysfunction, osteopathic diagnostics, osteopathic conclusion, dominant somatic dysfunction, osteopathic correction, medical records*

Funding. The study was not funded by any source.

Conflict of interest. The authors declare no obvious and potential conflicts of interest related to the publication of this article.

The article was received 31.01.2023

The article was accepted for publication 31.03.2023

The article was published 30.06.2023



МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Клинические рекомендации

Соматическая дисфункция

Кодирование по Международной статистической
классификации болезней и проблем, связанных
со здоровьем: **M99.0, M99.8, M99.9**

Возрастная группа: **взрослые, дети**

Год утверждения: **2023**

Разработчик клинических рекомендаций:

- **Общероссийская общественная организация содействия развитию остеопатии**
«Российская остеопатическая ассоциация»

Одобрены Научно-практическим советом Министерства здравоохранения Российской Федерации
(протокол от 27.12.2022 № 23)

Утверждены Правлением Общероссийской общественной организации содействия развитию
остеопатии «Российская остеопатическая ассоциация» (протокол от 18.01.2023 № 1/23)

Оглавление

Список сокращений.....	14
Термины и определения	14
1. Краткая информация по заболеванию или состоянию (группе заболеваний или состояний)	15
1.1. Определение заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний).....	15
1.2. Этиология и патогенез заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)	15
1.3. Эпидемиология заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний).....	17
1.4. Особенности кодирования заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний) по Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем	18
1.5. Классификация заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)	18
1.5.1. Классификация по механизму функционального нарушения	18
1.5.2. Классификация по уровню функционального нарушения.....	21
1.6. Клиническая картина заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний).....	35
2. Диагностика заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний), медицинские показания и противопоказания к применению методов диагностики	35
2.1. Жалобы и анамнез	37
2.2. Физикальное обследование.....	41
2.3. Лабораторные диагностические исследования	42

2.4. Инструментальные диагностические исследования.....	42
2.5. Иные диагностические исследования	42
3. Лечение, включая медикаментозную и немедикаментозную терапию, диетотерапию, обезболивание, медицинские показания и противопоказания к применению методов лечения	42
4. Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение, медицинские показания и противопоказания к применению методов медицинской реабилитации, в том числе основанных на использовании природных лечебных факторов.....	44
5. Профилактика и диспансерное наблюдение, медицинские показания и противопоказания к применению методов профилактики	45
6. Организация оказания медицинской помощи	45
6.1. Заполнение медицинской документации	45
6.2. Показания для госпитализации в медицинскую организацию.....	45
7. Дополнительная информация (в том числе факторы, влияющие на исход заболевания или состояния).....	45
Критерии оценки качества медицинской помощи	45
Список литературы.....	46
Приложение А1. Состав рабочей группы по разработке и пересмотру клинических рекомендаций.....	51
Приложение А2. Методология разработки клинических рекомендаций	52
Приложение А3. Справочные материалы, включая соответствие показаний к применению и противопоказаний, способов применения и доз лекарственных препаратов, инструкции по применению лекарственного препарата	53
Приложение А3.1. Организация медицинской помощи населению по профилю «остеопатия».....	53
Приложение А3.2. Заболевания, при которых доказаны положительные результаты остеопатической коррекции	58
Приложение А3.3. Действие остеопатической коррекции на организм	67
Приложение А3.4. Форма вкладыша № 1 «Первичный осмотр врачом-osteопатом».....	69
Приложение А3.5. Форма вкладыша № 2 «Осмотр врачом-osteопатом (наблюдение в динамике)»	74
Приложение Б. Алгоритмы действий врача	76
Приложение Б1. Алгоритм действий врача	76
Приложение Б2. Алгоритм сбора жалоб	77
Приложение Б3. Алгоритм общего остеопатического осмотра	80
Приложение Б4. Дополнительные тесты, проводимые при общем остеопатическом осмотре ребенка (дополнительно к Приложению Б3. Алгоритм общего остеопатического осмотра)	88
Приложение В. Информация для пациента	89
Приложение Г1–ГN. Шкалы оценки, вопросники и другие оценочные инструменты состояния пациента, приведенные в клинических рекомендациях	89

Список сокращений

ГБН — глобальное биомеханическое нарушение
ГНН — глобальное нейродинамическое нарушение
ГРН — глобальное ритмогенное нарушение
ЗВПО — задневерхняя подвздошная ость
КПС — крестцово-подвздошный сустав
ОК — остеопатическая коррекция
ОКС — острый коронарный синдром
ОНМК — острое нарушение мозгового кровообращения
ПВПО — передневерхняя подвздошная ость
РБН — региональное биомеханическое нарушение
РНН — региональное нейродинамическое нарушение
РРН — региональное ритмогенное нарушение
СД — соматическая дисфункция
СТ — соединительная ткань
СБС — сфенобазиллярный синхондроз
ТМО — твердая мозговая оболочка

Термины и определения

Комбинированные основные заболевания — конкурирующие, сочетанные болезни, основное и фоновое заболевание.

Осложнения основного заболевания — включает все осложнения, в том числе смертельное осложнение (всегда одно), осложнения медицинских мероприятий (ятрогенные осложнения, если они не становятся эквивалентом основного заболевания), а также указания на проведение реанимационных мероприятий, интенсивной терапии и их осложнений.

Основное заболевание — это одна или несколько нозологических единиц, по поводу которых проводилось обследование или лечение во время последнего эпизода обращения за медицинской помощью. В процессе лечения пациента диагноз основного заболевания может изменяться, причем неоднократно.

Остеопатия — область клинической медицины, включающая оказание медицинской помощи пациентам с соматическими дисфункциями на этапах профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, основанная на анатомо-функциональном единстве тела и использующая мануальные методы, восстанавливающие способности организма к самокоррекции. Остеопатия рассматривает организм человека как целостную систему, представляющую собой нечто более сложное, чем простая сумма его частей.

Сопутствующие заболевания — это одна или несколько нозологических единиц, которые в данное время (в ходе последнего эпизода оказания медицинской помощи, при наступлении летального исхода) не были непосредственно (этиологически, патогенетически) связаны с основным заболеванием и, в случае летального исхода, не принимали участие в танатогенезе. При этом по поводу сопутствующих заболеваний могли производиться определенные лечебно-диагностические мероприятия. Сопутствующие заболевания также могут иметь осложнения, но не могут иметь смертельных осложнений.

Фоновое заболевание — это нозологическая форма (заболевание, травма, реже — синдром), которая патогенетически (но не этиологически) связана с основным заболеванием, явилась одной из причин его развития (включившись в его патогенез), впоследствии отягощала течение и способствовала возникновению смертельных осложнений (в случае летального исхода).

1. Краткая информация по заболеванию или состоянию (группе заболеваний или состояний)

1.1. Определение заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

Соматическая дисфункция (СД) — это потенциально обратимое структурно-функциональное нарушение в тканях и органах, проявляющееся пальпаторно определяемыми ограничениями различных видов движений и подвижности.

1.2. Этиология и патогенез заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

Из всех возможных повреждающих воздействий следующие основные причины могут привести к возникновению СД:

- физические (статические и динамические механические воздействия, а также различные травмы);
- химические/метаболические (изменения гормонального фона, нарушения питания, режима сна и отдыха, различные, в том числе лекарственные, интоксикации);
- психоэмоциональные (эмоционально-чувственные реакции в ответ на воздействия внешней среды).

Структурно-функциональные нарушения в организме могут происходить остро (травма, острая интоксикация, стресс) или исподволь, хронически (длительная вынужденная поза, хроническая интоксикация, хроническое психоэмоциональное напряжение и т.п.). При воздействии повреждающих факторов изменения в организме сначала носят, как правило, функциональный, обратимый характер. Если человеку не оказывается адекватная медицинская помощь, а собственных адаптационных ресурсов недостаточно, то происходит соматизация нарушений, то есть патологические изменения структуры и функциональных свойств тканей и органов нарастают и из обратимых постепенно становятся необратимыми (рис. 1) [1]. Именно поэтому СД могут выявляться




Рис. 1. Взаимоотношение понятий «здоровье», «болезнь» и «соматическая дисфункция»

как при наличии, так и при отсутствии явных признаков заболевания. Локализация СД может не совпадать с локализацией клинических проявлений. На стадии обратимости остеопатическая коррекция максимально эффективна.

В соматической дисфункции можно выделить три основных компонента: биомеханический, гидродинамический и нейродинамический. Эти три составляющие объединяют все органы и подсистемы организма в единую целостную систему.

Понятие «соматическая дисфункция» в МКБ-10 относится к разделу биомеханических нарушений, но предмет остеопатической диагностики и лечения не сводится только к биомеханическим нарушениям [2].

Биомеханический компонент СД связан в основном с адаптационными изменениями в соединительной ткани. Соединительная ткань (СТ) и ее производные составляют 85% удельного веса тела [3]. Помимо того, что она формирует органы опорно-двигательного аппарата (кости, связки, суставы, фасции и т.д.), а также кожный покров и сосуды, СТ присутствует во всех без исключения органах. Она выполняет биомеханическую (опорную), трофическую (метаболическую), защитную (барьерную), структурообразовательную (пластическую, репаративную) и регуляторную (местная гуморальная регуляция) функции [4]. СТ активна, ее активность выражается в миграции клеток, синтезе и резорбции ими межклеточного матрикса и выделении физиологически активных веществ.

Локальная острая СД есть не что иное, как адаптационная реакция СТ, выражающаяся в функциональной реакции обменно-буферной системы (межклеточного матрикса) и основных клеток СТ, выраженной в выработке молекул, способствующих увеличению или уменьшению гидрофильности СТ (протеогликанов, гликозаминогликанов, в том числе гиалуроновой кислоты), изменению количества и характера межмолекулярного взаимодействия волокон коллагена и эластина в структуре межклеточного матрикса. В том случае, когда гомеостатического потенциала основных клеток СТ недостаточно для формирования адекватной функциональной реакции, клетки завершают свою жизнедеятельность путем апоптоза, предварительно вырабатывая большее количество коллагеновых волокон и белков, формирующих несистемную конгломерацию молекул коллагена, лежащую в основе формирования фиброза [4, 5]. Наличие фиброза или рубцовой ткани может быть важным звеном патогенеза СД.

В случаях, когда в патогенезе СД участвует воспалительная реакция в ответ на воздействие локального повреждающего фактора, развиваются альтерация, расстройство микроциркуляции и пролиферация, которые направлены на уничтожение и удаление повреждающего агента, а также на восстановление (или замещение) поврежденных тканей. Воспалительная реакция завершается полным выздоровлением или изменением поврежденной ткани с формированием фиброза, рубцового изменения, следствием которых может быть формирование хронической СД.

Вышеописанные нарушения проявляются ограничением подвижности тканей, уменьшением эластичности и увеличением их жесткости разной степени выраженности.

В этиологии формирования биомеханического компонента СД значительную роль играют механические воздействия экзогенного и эндогенного характера (из внешней среды и возникающие в самом организме), которые являются специфическими для СТ. Для ее клеток и межклеточного матрикса характерна структурная перестройка в соответствии с силой и характером механического воздействия [6]. Если в силу разных механических воздействий происходит избыточное натяжение какой-либо структуры (фасции, связки и т.д.), то повышается синтетическая активность фибробластов, в результате чего увеличивается количество молекул, влияющих на гидрофильность ткани, молекул тропоколлагена, самих коллагеновых волокон и изменяется форма эластиновых волокон и их взаимоотношения с коллагеновыми.

Этому способствуют также микроциркуляторные и метаболические нарушения. Первоначально СТ становится более гидрофильной, в дальнейшем уплотняется, теряет способность к ди-

наاميكة, формируется биомеханическая хроническая СД. Организм пытается скомпенсировать возникшие нарушения подвижности. Первичная СД может менять натяжение и подвижность других структур, в результате чего возможно возникновение новых СД на локальном и региональном уровнях.

Таким образом, биомеханический компонент СД представляет собой различные варианты адаптационной реакции СТ с изменением её качественных и количественных характеристик, в ряде случаев — с формированием фиброза и склероза с увеличением количества коллагеновых волокон и их взаиморасположения. Кроме того, СТ перестраивается при нарушениях кровообращения (гипоксия и гиперкапния) [7], при изменениях питания, с возрастом.

Гидродинамический компонент СД — это обратимое изменение гидрофильности с последующим нарушением тургора, вязкости, текучести, выработки и проведения глобальных эндогенных ритмов. Гидродинамические изменения в тканях могут быть связаны с изменением метаболизма и их коллоидных свойств [8–10], а также с уменьшением артериального притока, микроциркуляции, венозного и/или лимфатического оттока и ликвородинамики. Состояние обменно-буферной системы в виде межклеточного матрикса определяет обмен веществ и энергии основных клеток СТ. Его можно рассматривать как раствор высокомолекулярных соединений, который характеризуется гидрофильностью, текучестью, вязкостью, и имеет сетчато-каркасное строение.

Нейродинамический компонент СД представляет собой обратимое нарушение проведения нервного сигнала в одном из звеньев рефлекторной дуги вследствие повышения его возбудимости (острое нарушение) либо разобщения связей между нейронами в нервных центрах как проявление пластичности ЦНС (хроническое нарушение). В результате изменяется тонус и сокращение скелетных мышц и гладкомышечных органов, появляется боль или болезненность, изменяется чувствительность, нарушаются рефлексы. Нейродинамический компонент может быть более выражен на надсегментарном уровне — психовисцеросоматические нарушения, на межсегментарном — постуральные нарушения и нарушения двигательного стереотипа и согласованности движений, или на сегментарном уровне — висцеро-соматические или соматовисцеральные проявления.

Наличие висцеромоторных и моторно-висцеральных взаимоотношений было убедительно доказано физиологической школой В. Н. Черниговского [11]. Исследования Ирвина Корра показали, что избыточный афферентный вход в спинной мозг является причиной повышения возбудимости спинномозговых нейронов, вызывая увеличенные моторные и симпатические реакции на уровне вовлеченного сегмента в ответ на обычные раздражители [12, 13]. Перевозбуждение периферических сенсорных рецепторов чаще всего обусловлено изменениями в СТ, которая их окружает. Накопление медиаторов воспаления sensibilizes механорецепторы, из-за чего может формироваться болевое ощущение при обычном, не травмирующем ткани, механическом воздействии. Такая периферическая sensibilization, как предполагается, лежит в основе повышенной чувствительности к прикосновению, обнаруживаемой при СД [14]. Нарушение архитектоники СТ (фиброзирование) может приводить к искажению проприорецепции и нарушению постуральных рефлексов [15]. С возрастом такие нарушения «накапливаются».

1.3. Эпидемиология заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

СД является результатом адаптационной реакции организма, направленной на поддержание гомеостаза, в ответ на воздействие экзогенных и эндогенных факторов. Как правило, эта реакция имеет индивидуальный характер и зависит от адаптационных возможностей конкретного организма. Лица, подвергающиеся воздействиям аналогичных повреждающих факторов, так же как и пациенты, имеющие аналогичные заболевания, могут иметь разную структуру СД. Понимание

этого факта обуславливает индивидуальный характер остеопатической коррекции. В связи с этим проведение популяционных исследований распространенности СД имеет ограниченный характер. В то же время накоплено уже достаточно данных о распространенности СД у пациентов с самой различной патологией.

1.4. Особенности кодирования заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний) по Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем

Соматические дисфункции (СД) включены в Международную классификацию болезней, травм и состояний, влияющих на здоровье, 10-го пересмотра.

M99.0 Сегментарная или соматическая дисфункция:

- M99.00 Биомеханическая дисфункция — область шеи.
- M99.01 Соматическая дисфункция — область головы.
- M99.02 Соматическая дисфункция — область груди.
- M99.03 Соматическая дисфункция — область поясницы.
- M99.04 Соматическая дисфункция — область крестца.
- M99.05 Соматическая дисфункция — область таза.
- M99.06 Соматическая дисфункция — нижняя конечность.
- M99.07 Соматическая дисфункция — верхняя конечность.
- M99.08 Соматическая дисфункция — грудная клетка.
- M99.09 Соматическая дисфункция — область живота и другие.

M99.8 Другие биомеханические нарушения.

M99.9 Биомеханические нарушения неуточненные.

1.5. Классификация заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

1.5.1. Классификация по механизму функционального нарушения

В структуре СД условно выделяют биомеханическую, гидродинамическую/ритмогенную и нейродинамическую составляющие:

- 1) *биомеханическая составляющая СД* — это потенциально обратимое нарушение подвижности, податливости и эластичности тканей тела человека;
- 2) *гидродинамическая составляющая СД* — потенциально обратимое нарушение вязкостных характеристик тканей и естественного тока жидкостей тела человека, пальпаторно определяемое в том числе как нарушение выработки, передачи и синхронизации эндогенных ритмов (синоним: ритмогенная составляющая СД);
- 3) *нейродинамическая составляющая СД* — это потенциально обратимое нарушение процессов нервной регуляции.

Нарушение подвижности, то есть СД, может иметь несколько компонентов:

- фасциальный (биомеханический) — снижение эластичности (упругости), смещаемости, податливости, увеличение жесткости;
- метаболический (жидкостный) — увеличение вязкости, нарушение «метаболических» ритмов;
- нейродинамический — нарушение нервной регуляции (тонуса и сокращения скелетных мышц и гладкомышечных органов).

Эти компоненты могут сочетаться и иметь разную степень выраженности. Они выявляются врачами-osteopатами при пальпаторном обследовании и проведении специальных тестов. Типичные диагностические индикаторы для СД, определяемые пальпаторно, — это нарушения биомеханических свойств тканей: ненормальность текстуры ткани (вязкости, эластичности, жесткости), асимметрия, ограничение движения и подвижности (рис. 2).



Рис. 2. Нарушения, выявляемые при остеопатической диагностике

Восстановление подвижности приводит к нормализации функционального состояния тканей и является целью применения остеопатических лечебных техник.

В 2010 г. Всемирная организация здравоохранения сформулировала пять основных моделей структурно-функциональных отношений, которыми врачам-osteопатам следует руководствоваться в диагностике и лечении [17].

1. Биомеханическая. В этой модели делается акцент на значимости правильной позы и равновесия тела для поддержания баланса. Напряжение или дисбаланс, возникающие в механизмах их поддержания, изменяют структуру суставов и отражаются на восприятии собственного тела. При этом могут нарушаться двигательные функции, нарастают энергозатраты на поддержание позы и перемещение тела в пространстве. Соответственно, целью врача-osteопата является восстановление осанки, баланса тела и способствование эффективной работе опорно-двигательного аппарата.

2. Респираторно-циркуляторная. Главным условием нормального функционирования органов эта модель полагает беспрепятственный обмен жидкостями между клеткой и интерстицием: доставку кислорода и питательных веществ и удаление продуктов клеточного метаболизма. Патологическое напряжение, если оно возникает в тканях, препятствует токам жидкостей, что ведет к повреждению тканей. Соответственно, врач-osteопат стремится устранить препятствия внешнему дыханию, циркуляции крови и других жидкостей тела.

3. Нейрологическая. В этой модели главный элемент — нейроиммунно-эндокринная система с ее балансом афферентно-эфферентных потоков и ноцицепции. Изменения в интеро- и особенно в ноцицепции вызывают нарушения работы спинальных эфферентных нейронов (повышение их возбудимости) и приводят к патологии функционирования иннервируемых ими органов. В данной модели акцент делается на взаимодействии автономной (вегетативной) и соматической нервной системы. Уменьшая механические напряжения, остеопат стремится сбалансировать афферентные потоки и устранить патологические изменения в ноцицепции.

4. Биопсихосоциальная. В центре этой модели — сумма воздействующих на человека экологических, социально-экономических, культурных, физических и психологических факторов, и задача врача-osteопата — устранить последствия биопсихосоциального стресса.

5. Биоэнергетическая. В основе этой модели — баланс между энергопродукцией и энерготратами и правильное распределение энергии в организме, что необходимо для адаптации к различным стрессорам (иммунному, пищевому, психологическому и т.д.). Усилия врачей-osteопатов должны быть направлены на устранение факторов, препятствующих правильному энергетическому балансу тела, нарушающих регулирование производства, распределения или расхода энергии.

В последнее время предложена дополнительная модель — **пептидная**. В основе данной модели — накопленный материал, показывающий эффект остеопатического воздействия, выражающийся в высвобождении различных пептидных компонентов регуляторных гомеостатических механизмов организма [18].

Все модели включают центральное понятие остеопатии — соматическую дисфункцию. Каждая взятая в отдельности модель несет ограниченный специфический подход к выбору определенных параметров анализа человеческого тела. Эти модели дополняют друг друга, поэтому в реальной остеопатической практике необходимо использование их совокупности.

Использование этих моделей позволяет, отталкиваясь от возможных повреждающих факторов, вызывающих патологические изменения в организме, и от знаний о типовых патологических процессах, обозначить (выделить) то, на какие структуры в первую очередь должно быть направлено диагностическое и лечебное внимание остеопата.

В соответствии с этими составляющими проводится остеопатическая диагностика, о которой далее подробно пойдет речь. СД в организме могут проявляться на глобальном, региональном или локальном уровнях. Состояние пациента может быть также описано (охарактеризовано) на этих трех уровнях со стороны биомеханических, ритмогенных и нейродинамических нарушений (рис. 3).




Рис. 3. Классификация соматических дисфункций

1.5.2. Классификация по уровню функционального нарушения

1.5.2.1. Глобальный уровень проявления соматической дисфункции (уровень организма в целом)

1. *Глобальное биомеханическое нарушение* (ГБН) — это обратимое изменение характеристик тканей, не соответствующее возрасту, не связанное с острым болевым синдромом, затрагивающее три осевых региона и более (полирегиональность) и сопровождающееся значимым ограничением подвижности тела в одной из плоскостей пространства.

2. *Глобальное ритмогенное/гидродинамическое нарушение* (ГРН) — это обратимое расстройство выработки эндогенных ритмов. С клинической точки зрения может быть обусловлено как функциональными, так и сочетанием функциональных и органических причин и проявляется во всех тканях целостного организма.

Наиболее часто оцениваются следующие эндогенные ритмы: краниальный, торакальный (дыхательный) и кардиальный (сердечный). Оценка осуществляется по следующим параметрам: частота, сила и амплитуда.

- Глобальное ритмогенное краниальное нарушение — нарушение выработки краниального ритмического импульса (КРИ), которое на уровне региона головы проявляется в виде снижения частоты, амплитуды, силы КРИ, а на периферическом уровне — изменением глобального расширения/сжатия (наружная и внутренняя ротация) тканей тела.
- Глобальное ритмогенное кардиальное нарушение — нарушение выработки кардиального ритмического импульса, формирующего вторичные полирегиональные соматические дисфункции. Проявляется на уровне сердца изменением ритма, снижением амплитуды и силы кардиального ритмического импульса, на периферии — изменением основных характеристик пульса, а также изменением гидродинамических характеристик тканей вследствие их гипоксии.
- Глобальное ритмогенное торакальное нарушение — нарушение выработки торакального ритмического импульса, формирующего вторичные полирегиональные СД. Проявляется на уровне легких изменением ритма, снижением амплитуды, силы торакального ритмического импульса и на периферии — изменением гидродинамических характеристик тканей вследствие их гипоксии.

3. *Глобальное нейродинамическое нарушение* (ГНН) — это обратимое нарушение нервной регуляции организма, проявляющееся психовисцеросоматическими, постуральными расстройствами и/или нарушениями двигательных стереотипов. Постуральное нарушение — это изменение подвижности тканей и позиции тела в пространстве, связанное с нарушением процессов проприоцепции.

Психовисцеросоматическое нарушение (ПВСН) — это состояние тканей, характеризующее вторичными полирегиональными соматическими ограничениями подвижности, которые связаны с психоэмоциональным компонентом.

Нарушение двигательных стереотипов (нормальных синергий) — изменение подвижности тканей, связанное с функциональными нарушениями безусловно-рефлекторных комплексов взаимосвязанных движений (ходьба, содружественные движения головы и глаз, частей тела и т. п.) вследствие разобщения в центральных звеньях рефлекторных дуг.

1.5.2.2. Региональный уровень проявления соматической дисфункции (уровень одного из регионов тела)

1. *Региональное биомеханическое нарушение* (РБН) — это обратимое изменение подвижности, податливости и эластичности тканей, которое выявляется в одном из регионов организма.

Остеопаты условно выделяют следующие регионы: регион головы, регион шеи, грудной, поясничный и тазовый регионы, регионы верхних конечностей (правой и левой) и нижних конечностей

(правой и левой), регион твердой мозговой оболочки (краниосакральная система как отдельный регион).

2. Региональное ритмогенное нарушение (РРН)

На региональном уровне отдельно ритмогенную составляющую можно не выделять, так как она связана в той или иной степени с определенной региональной ригидностью тканей, а значит, оценивается в разделе региональных биомеханических нарушений. В то же время на региональном уровне могут происходить гидродинамические нарушения — ухудшение артериального притока, микроциркуляции, венозного и/или лимфатического оттока. Причинами этих нарушений могут быть натяжение или компрессия соединительнотканых структур, перестройка соединительной ткани или спазмированные мышцы.

3. Региональное нейродинамическое нарушение (РНН) — это изменение состояния тканей тела, связанное с раздражением одного или нескольких звеньев рефлекторной дуги: рецепторов; отростков чувствительных, вегетативных и двигательных нейронов, идущих в составе периферических нервов; вегетативных ганглиев или симпатического ствола; спинномозговых корешков; сегментов спинного мозга. Региональное нейродинамическое нарушение может проявляться висцеросоматическими, висцеровисцеральными, соматосоматическими и соматовисцеральными дисфункциями. Механизм формирования РНН достаточно полно описан Ирвином Корром, который сформулировал теорию об «упрощенном медуллярном сегменте» на основе многочисленных экспериментальных и клинических исследований.

1.5.2.3. Локальный уровень (уровень функциональных изменений в одном или нескольких органах тела)

На локальном уровне определяются отдельные СД того или иного органа. При этом СД на данном уровне на основании оценки биомеханического, ритмогенного и нейродинамического компонентов может определяться как острая или хроническая (табл. 1). Выделение острых и хронических дисфункций может быть и на других уровнях, но именно для локальных СД это имеет большее клиническое значение.

Таблица 1

Компоненты локальной соматической дисфункции

Компонент	Острая соматическая дисфункция	Хроническая соматическая дисфункция
Биомеханический	Слабо ограниченная смещаемость	Значительно ограниченная смещаемость
Ритмогенный	Повышение гидратации тканей (отек), повышение местной температуры	Дегидратация тканей (фиброз), понижение местной температуры
Нейродинамический	Острая боль, выраженная болезненность	Менее выраженная боль и болезненность

Локальные соматические дисфункции

1. Соматические дисфункции костно-мышечной системы

1.1. Соматические дисфункции верхней конечности

• Соматические дисфункции грудино-ключичного сустава

- Соматическая дисфункция грудино-ключичного сустава в компрессии — дисфункция ключицы, заключающаяся в ее медиальном смещении, сопровождающаяся глобальным ограничением подвижности в грудино-ключичном суставе.

- Соматическая дисфункция ключицы в верхнем положении — смещение грудинного конца ключицы в цефалическом направлении с ограничением подвижности в каудальном направлении.
- Соматическая дисфункция ключицы в нижнем положении — смещение грудинного конца ключицы в каудальном направлении с ограничением подвижности в цефалическом направлении.
- Соматическая дисфункция ключицы в переднем положении — смещение грудинного конца ключицы вентрально с ограничением дорсолатерального движения.
- **Соматические дисфункции акромиально-ключичного сустава**
 - Соматическая дисфункция акромиально-ключичного сустава в раскрытии — смещение акромиального конца ключицы вентрально с ограничением подвижности в дорсальном направлении.
 - Соматическая дисфункция акромиально-ключичного сустава в закрытии — смещение акромиального конца ключицы дорсально с ограничением подвижности в вентральном направлении.
- **Соматические дисфункции плечевого сустава**
 - Соматическая дисфункция головки плечевой кости в верхнем положении — смещение головки плечевой кости цефалически с ограничением каудального движения.
 - Соматическая дисфункция плечевой кости в переднем положении — смещение головки плечевой кости вентрально с ограничением подвижности в дорсальном направлении.
 - Соматическая дисфункция плечевой кости в заднем положении — смещение головки плечевой кости дорсально с ограничением подвижности в вентральном направлении.
 - Соматическая дисфункция плечевой кости в передневерхнем положении — смещение головки плечевой кости цефалически и вентрально с ограничением каудального и дорсального вектора движения.
- **Соматические дисфункции лучелоктевого сустава**
 - Соматическая дисфункция — заднее смещение головки лучевой кости.
 - Соматическая дисфункция — переднее смещение головки лучевой кости.
- **Соматические дисфункции плечелоктевого сустава**
 - Соматическая дисфункция локтевой кости в приведении.
 - Соматическая дисфункция локтевой кости в отведении.
- **Соматические дисфункции лучезапястного сустава**
 - Соматическая дисфункция флексии-экстензии, лучевой-локтевой девиации, супинации-пронации.
- **Соматические дисфункции пястно-фаланговых и межфаланговых суставов.**

1.2. Соматические дисфункции нижней конечности

- **Соматические дисфункции тазобедренного сустава**
 - Соматическая дисфункция головки тазобедренного сустава в переднем положении — вентральное смещение головки бедренной кости относительно вертлужной впадины.
 - Соматическая дисфункция головки тазобедренного сустава в заднем положении — дорсальное смещение головки бедренной кости относительно вертлужной впадины.
- **Соматические дисфункции коленного сустава**
 - Соматическая дисфункция большеберцовой кости в переднем положении — вентральное смещение большеберцовой кости под бедренной костью.
 - Соматическая дисфункция большеберцовой кости в заднем положении — дорсальное смещение большеберцовой кости под бедренной костью.
 - Соматическая дисфункция большеберцовой кости в приведении — смещение дистальной части большеберцовой кости к средней линии.

- Соматическая дисфункция большеберцовой кости в отведении — смещение дистальной части большеберцовой кости в латеральном направлении.
- Соматическая дисфункция большеберцовой кости в наружной трансляции — смещение большеберцовой кости под бедренной костью кнаружи (травматическая дисфункция).
- Соматическая дисфункция большеберцовой кости во внутренней трансляции — смещение всей большеберцовой кости под бедренной костью кнутри (травматическая дисфункция).
- Соматическая дисфункция внутреннего мениска в медиальном положении — наружная ротация большеберцовой кости относительно бедренной кости со смещением внутреннего мениска медиально и вентрально.
- Соматическая дисфункция наружного мениска в латеральном положении — внутренняя ротация большеберцовой кости относительно бедренной кости со смещением наружного мениска латерально и вентрально.
- *Соматические дисфункции малоберцовой кости*
 - Соматическая дисфункция головки малоберцовой кости в переднем положении — смещение головки малоберцовой кости вентрально относительно большеберцовой кости.
 - Соматическая дисфункция головки малоберцовой кости в заднем положении — смещение головки малоберцовой кости дорсально относительно большеберцовой кости.
 - Соматическая дисфункция латеральной лодыжки в переднем положении — смещение латеральной лодыжки (дистальной части малоберцовой кости) вентрально относительно большеберцовой кости.
 - Соматическая дисфункция латеральной лодыжки в заднем положении — смещение латеральной лодыжки (дистальной части малоберцовой кости) дорсально относительно большеберцовой кости.
 - Соматическая дисфункция малоберцовой кости в верхнем положении — смещение в цефалическом направлении малоберцовой кости относительно большеберцовой кости в верхнем и нижнем большеберцово-малоберцовом суставах.
 - Соматическая дисфункция малоберцовой кости в наружной ротации — положение малоберцовой кости в наружной ротации относительно большеберцовой кости.
 - Соматическая дисфункция малоберцовой кости во внутренней ротации — положение малоберцовой кости во внутренней ротации относительно большеберцовой кости.
- *Соматические дисфункции голеностопного сустава*
 - Соматическая дисфункция таранной кости в переднем положении — вентральное смещение таранной кости относительно вилки голеностопного сустава.
 - Соматическая дисфункция берцовой вилки голеностопного сустава в переднем положении — смещение таранной кости дорсально относительно вилки голеностопного сустава.
- *Соматические дисфункции подтаранного сустава*
 - Соматическая дисфункция головки таранной кости в передневнутреннем смещении — смещение головки таранной кости медиально и вентрально относительно пяточной кости.
 - Соматическая дисфункция головки таранной кости в задненаружном смещении — смещение головки таранной кости кзади и кнаружи относительно пяточной кости.
- *Соматические дисфункции ладьевидно-кубовидной пары*
 - Соматическая дисфункция ладьевидной кости в верхнем положении — смещение в цефалическом направлении ладьевидной кости относительно таранной кости в супинационном паттерне стопы.
 - Соматическая дисфункция кубовидной кости в верхнем положении — смещение в цефалическом направлении кубовидной кости относительно пяточной кости в пронационном паттерне стопы.

- Соматическая дисфункция кубовидной кости в нижнем положении — смещение в каудальном направлении кубовидной кости относительно пяточной кости в супинационном паттерне стопы.
- Соматическая дисфункция ладьевидной кости в нижнем положении — смещение в каудальном направлении ладьевидной кости относительно таранной кости в пронационном паттерне стопы.
- **Соматические дисфункции клиновидных костей**
 - Соматическая дисфункция I клиновидной кости в верхнем положении — смещение I клиновидной кости в цефалическом направлении относительно ладьевидной кости.
 - Соматическая дисфункция I клиновидной кости в нижнем положении — смещение I клиновидной кости в каудальном направлении относительно ладьевидной кости.
 - Соматическая дисфункция II клиновидной кости в верхнем положении — смещение II клиновидной кости в цефалическом направлении относительно ладьевидной кости.
 - Соматическая дисфункция III клиновидной кости в верхнем положении — смещение III клиновидной кости в цефалическом направлении относительно кубовидной кости.
 - Соматическая дисфункция III клиновидной кости в нижнем положении — смещение III клиновидной кости в каудальном направлении относительно кубовидной кости.

1.3. Соматические дисфункции лонного сочленения

- Соматическая дисфункция лонного сочленения в компрессии — дисфункция лонных костей, заключающаяся в медиальном смещении обеих костей с резким ограничением всех видов движений в лонном симфизе.
- Соматическая дисфункция лонной кости в заднем (задневерхнем) положении — смещение лонной кости в цефалодорсальном направлении с ограничением подвижности в каудально-вентральном направлении. Сопровождается функциональным удлинением конечности на стороне дисфункции.
- Соматическая дисфункция лонной кости в переднем (передненижнем) положении — смещение лонной кости в каудально-вентральном направлении с ограничением подвижности в цефалодорсальном направлении. Сопровождается функциональным укорочением конечности на стороне дисфункции.

1.4. Соматические дисфункции подвздошной кости

- Соматическая дисфункция подвздошной кости в переднем положении — смещение подвздошной кости в положение передней ротации. Задняя ротация ограничена. При этом на стороне дисфункции передняя верхняя подвздошная ось (ПВПО) располагается каудально, задняя верхняя подвздошная ось (ЗВПО) — цефалически, седалищный бугор — дорсокаудально по отношению к противоположной стороне; конечность на стороне дисфункции удлинена.
- Соматическая дисфункция подвздошной кости в заднем положении — смещение подвздошной кости в положение задней ротации. Передняя ротация ограничена. При этом на стороне дисфункции ПВПО располагается цефалически, ЗВПО — каудально, седалищный бугор — вентрально-цефалически по отношению к противоположной стороне; конечность на стороне дисфункции укорочена.
- Соматическая дисфункция подвздошной кости в раскрытии — смещение подвздошной кости в положение наружной ротации таким образом, что на стороне дисфункции ПВПО располагается более латерально, ЗВПО — более медиально (с заполнением бороздки крестцово-подвздошного сустава). Расстояние от пупка до ПВПО больше на стороне дисфункции. Внутренняя ротация ограничена.

- Соматическая дисфункция подвздошной кости в закрытии — смещение подвздошной кости в положение внутренней ротации таким образом, что на стороне дисфункции ПВПО располагается более медиально, ЗВПО — более латерально (с углублением бороздки крестцово-подвздошного сустава). Расстояние от пупка до ПВПО меньше на стороне дисфункции. Наружная ротация ограничена.
- Соматическая дисфункция подвздошной кости в верхнем положении (дисфункция «апслип», «upsleep») — смещение подвздошной кости цефалически. На стороне дисфункции ПВПО и ЗВПО находятся более цефалически, седалищный бугор и гребень подвздошной кости — более цефалически; конечность функционально укорочена.

1.5. Соматические дисфункции крестца

- Соматическая дисфункция крестца в передней торсии (физиологическая) (левая по левой оси) — нарушение подвижности крестца вокруг оси его физиологического механического движения, заключающееся в смещении крестца таким образом, что верхний правый квадрант крестца находится вентрально, а нижний левый квадрант — дорсально и каудально.
- Соматическая дисфункция крестца в передней торсии (физиологическая) (правая по правой оси) — является зеркальным отображением левой торсии по левой оси.
- Соматическая дисфункция крестца в задней торсии (нефизиологическая) (правая по левой оси) — нарушение подвижности крестца вокруг оси его физиологического механического движения, заключающееся в смещении крестца таким образом, что правый верхний квадрант крестца находится дорсально, а левый нижний квадрант — вентрально и цефалически.
- Соматическая дисфункция крестца в задней торсии (нефизиологическая) (левая по правой оси) — является зеркальным отображением правой торсии по правой оси.
- Соматическая дисфункция крестца в односторонней флексии — дисфункция крестца, заключающаяся в его смещении таким образом, что на стороне дисфункции основание находится вентрально, а нижнелатеральный угол — каудально и дорсально. Экстензия крестца ограничена. Удлинение конечности на стороне дисфункции (в положении лежа на животе).
- Соматическая дисфункция крестца в односторонней экстензии — дисфункция крестца, заключающаяся в его смещении таким образом, что на стороне дисфункции основание находится дорсально, а нижнелатеральный угол — вентрально. Флексия крестца ограничена. Укорочение конечности на стороне дисфункции (в положении лежа на животе).
- Соматическая дисфункция крестца в двусторонней флексии — дисфункция крестца, заключающаяся в его двустороннем смещении в положение механической флексии (нутации, наклона вперед). Экстензия крестца ограничена.
- Соматическая дисфункция крестца в двусторонней экстензии — дисфункция крестца, заключающаяся в его двустороннем смещении в положение механической экстензии (контрнутации, наклона назад). Флексия крестца ограничена.

1.6. Соматические дисфункции позвонков

- Соматическая дисфункция Вебстера — специфическая дисфункция грудного позвонка, заключающаяся в его трансляции во фронтальной плоскости и с одноименной ротацией, сопровождающаяся асинхронизмом краниосакральной системы.
- Соматическая дисфункция FRS — дисфункция позвоночно-двигательного сегмента, заключающаяся в смещении вышележащего позвонка относительно нижележащего. Вышележащий позвонок находится в положении флексии, сопровождающейся односторонними ротацией и боковым наклоном (латерофлексией). Движения экстензии, ротации и бокового наклона в другую сторону ограничены.
- Соматическая дисфункция ERS — дисфункция позвоночно-двигательного сегмента, заключающаяся в смещении вышележащего позвонка относительно нижележащего. Вышележащий

позвонок находится в положении экстензии, сопровождающейся односторонними ротацией и боковым наклоном (латерофлексией). Движения флексии, ротации и бокового наклона в другую сторону ограничены.

- Соматическая дисфункция NSR — групповая дисфункция позвонков, заключающаяся в их смещении в положение ротации и бокового наклона. Ротация и боковой наклон в другую сторону ограничены.
- Соматическая дисфункция отдела позвоночника — сочетанная дисфункция группы позвонков, которая включает две и более дисфункции (с указанием направлений дисфункций). Целесообразно дифференцировать с региональной соматической дисфункцией.

1.7. Соматические дисфункции ребер

- Соматическая дисфункция ребра в компрессии — дисфункция ребра, заключающаяся в смещении головки ребра вентрально, а грудинного конца ребра дорсально. При этом аксиллярная часть ребра выступает (смещается латерально). Дисфункция резко ограничивает все виды движений ребра.
- Соматическая дисфункция ребра в дисторсии — дисфункция ребра, заключающаяся в смещении его головки дорсально, а грудинной части вентрально. Аксиллярная часть ребра западает (смещается медиально). Дисфункция резко ограничивает все виды движений ребра.
- Соматическая дисфункция ребра на вдохе — смещение ребра в положение вдоха с ограничением его движения на выдохе.
- Соматическая дисфункция ребра на выдохе — смещение ребра в положение выдоха с ограничением его движения на вдохе.
- Соматическая дисфункция ребра в переднем положении (передний подвывих) — смещение головки ребра вентрально, сопровождающееся западением заднего угла ребра.
- Соматическая дисфункция ребра в заднем положении (задний подвывих) — смещение головки ребра дорсально, сопровождающееся выбуханием заднего угла ребра.

2. Соматические дисфункции краниосакральной системы и органов головы

Физиологические дисфункции СБС

1. *Соматическая дисфункция СБС: флексия* — дисфункция СБС, выражающаяся в преобладании амплитуды флексии по сравнению с амплитудой экстензии в СБС в рамках краниального ритмического импульса.
2. *Соматическая дисфункция СБС: экстензия* — дисфункция СБС, выражающаяся в преобладании амплитуды экстензии по сравнению с амплитудой флексии в СБС в рамках краниального ритмического импульса.
3. *Соматическая дисфункция СБС: торсия* — дисфункция СБС, выражающаяся в разнонаправленном повороте клиновидной и затылочной костей вокруг переднезадней оси движения (сагиттальной оси). Дисфункция физиологическая (сохранены движения вокруг физиологических осей затылочной и клиновидной костей).
4. *Соматическая дисфункция СБС: боковой наклон с ротацией (SBR, side-bend-rotation)* — дисфункция СБС, выражающаяся в разнонаправленном развороте клиновидной и затылочной костей вокруг патологических вертикальных осей и одноименном наклоне этих костей вокруг патологической сагиттальной оси. Дисфункция физиологическая (сохранены движения вокруг физиологических осей затылочной и клиновидной костей).

Нефизиологические дисфункции СБС

5. *Соматическая дисфункция СБС: вертикальный стрейн* — дисфункция СБС, выражающаяся в смещении тела клиновидной кости выше (верхний-высокий стрейн) или ниже (нижний-низкий стрейн) основания затылочной кости, формирующаяся в результате однонаправ-

- ленного поворота затылочной и клиновидной костей относительно собственных поперечных осей.
6. *Соматическая дисфункция СБС: латеральный стрейн* — дисфункция СБС, выражающаяся в смещении тела клиновидной кости влево (левый стрейн) или вправо (правый стрейн) относительно основания затылочной кости, формирующаяся в результате однонаправленного поворота затылочной и клиновидной костей относительно собственных вертикальных осей.
 7. *Соматическая дисфункция СБС в компрессии* — дисфункция СБС, заключающаяся в сближении тела клиновидной кости с основанием затылочной кости, приводящим к резкому ограничению амплитуды движения СБС в краниальном ритме.
 8. *Соматическая дисфункция височной кости* — ротация височной кости: наружная (проявляющаяся преобладанием амплитуды наружной ротации по отношению к амплитуде внутренней ротации) или внутренняя (проявляющаяся преобладанием амплитуды внутренней ротации по отношению к амплитуде наружной ротации).
 9. *Соматическая дисфункция лобной кости* — ротация лобной кости: наружная (проявляющаяся преобладанием амплитуды наружной ротации по отношению к амплитуде внутренней ротации) или внутренняя (проявляющаяся преобладанием амплитуды внутренней ротации по отношению к амплитуде наружной ротации).
 10. *Соматическая дисфункция теменной кости* — ротация теменной кости: наружная (проявляющаяся преобладанием амплитуды наружной ротации по отношению к амплитуде внутренней ротации) или внутренняя (проявляющаяся преобладанием амплитуды внутренней ротации по отношению к амплитуде наружной ротации).
 11. *Соматическая дисфункция скуловой кости* — ротация скуловой кости: наружная (проявляющаяся преобладанием амплитуды наружной ротации по отношению к амплитуде внутренней ротации) или внутренняя (проявляющаяся преобладанием амплитуды внутренней ротации по отношению к амплитуде наружной ротации).
 12. *Соматическая дисфункция верхней челюсти* — ротация верхней челюсти: наружная (проявляющаяся преобладанием амплитуды наружной ротации по отношению к амплитуде внутренней ротации) или внутренняя (проявляющаяся преобладанием амплитуды внутренней ротации по отношению к амплитуде наружной ротации).
 13. *Соматическая дисфункция костей лицевого черепа* — дисфункция, проявляющаяся ограничением подвижности определенной кости относительно собственных физиологических осей.
 14. *Соматическая дисфункция твердой мозговой оболочки (ТМО)* — дисфункция, проявляющаяся ограничением подвижности ТМО в местах ее физиологического прикрепления. Характеризуется ограничением свободы ТМО.
 15. *Соматическая дисфункция «Wiplash» (по типу хлыстовой травмы)* — дисфункция, характеризующаяся асинхронным движением затылочной кости и крестца. Сопровождается ограничением движения ТМО.
 16. *Соматическая дисфункция височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС)* — ограничение подвижности и/или смещение нижней челюсти.
 17. *Соматическая дисфункция черепных нервов* — компримирование или нарушение нормального (физиологического) положения одного из нервов в зонах остеопатических конфликтов (СД костей черепа, ТМО).
 18. *Соматическая дисфункция швов черепа* — дисфункция, проявляющаяся ограничением подвижности швов черепа.
 19. *Соматическая дисфункция «краниосакральный асинхронизм»* — дисфункция, проявляющаяся нарушением симфазности работы краниальной и сакральной составляющих краниосакральной системы.

20. Соматическая дисфункция «внутрикостное повреждение» — дисфункция, характеризующаяся изменением напряжения в определенных частях кости (часто обусловлена особенностями эмбрионального развития костей черепа или прямой травмой).
21. Соматическая дисфункция структур вегетативной нервной системы (ВНС) — дисфункция с повреждением симпатической или парасимпатической составляющей ВНС.

3. Соматические дисфункции периферической нервной системы

4. Соматические дисфункции внутренних органов

- Соматические дисфункции гортанно-глоточного комплекса
 - Соматическая дисфункция гортанно-глоточного комплекса в правой ротации — дисфункция, при которой преобладает ротация гортанно-глоточного комплекса относительно вертикальной оси вправо.
 - Соматическая дисфункция гортанно-глоточного комплекса в левой ротации — дисфункция, при которой преобладает ротация гортанно-глоточного комплекса относительно вертикальной оси влево.
 - Соматическая дисфункция гортанно-глоточного комплекса в правом боковом наклоне — дисфункция, при которой преобладает правый боковой наклон гортанно-глоточного комплекса относительно переднезадней оси.
 - Соматическая дисфункция гортанно-глоточного комплекса в левом боковом наклоне — дисфункция, при которой преобладает левый боковой наклон гортанно-глоточного комплекса относительно переднезадней оси.
 - Соматическая дисфункция гортанно-глоточного комплекса в верхнем положении — дисфункция, при которой преобладает краниальное смещение гортанно-глоточного комплекса.
 - Соматическая дисфункция гортанно-глоточного комплекса в нижнем положении — дисфункция, при которой преобладает каудальное смещение гортанно-глоточного комплекса.
 - Сочетанная соматическая дисфункция гортанно-глоточного комплекса — дисфункция, которая включает две и более соматических дисфункции (с указанием направлений дисфункций).
- Соматические дисфункции легких
 - Соматическая дисфункция доли легкого (с указанием доли) на вдохе — дисфункция, при которой наблюдается преобладание движения доли легкого в фазе диафрагмального вдоха по сравнению с фазой выдоха.
 - Соматическая дисфункция доли легкого (с указанием доли) на выдохе — дисфункция, при которой наблюдается преобладание движения доли легкого в фазе диафрагмального выдоха по сравнению с фазой вдоха.

Данные соматические дисфункции могут быть сочетанными, то есть включать любое количество долей легких в любых дисфункциях.

1. Ограничение мобильности верхней доли легкого, вызванное преимущественно рестрикцией связок купола плевры.
2. Ограничение мобильности верхней доли легкого, вызванное преимущественно рестрикцией связки-ракетки (связки корня легкого).
3. Ограничение мобильности нижней доли легкого, вызванное преимущественно фиксациями плевры.
4. Ограничение мобильности нижней доли легкого, вызванное преимущественно рестрикцией межплевральной связки.
5. Ограничение мотильности верхней/нижней доли легкого с преобладанием фазы экспир.

6. Ограничение мотильности верхней/нижней доли легкого с преобладанием фазы инспир.
 - Соматическая дисфункция доли легкого (с указанием доли) в экспир-фазе мотильности — дисфункция, при которой наблюдается преобладание движения доли легкого в экспир-фазе мотильности по сравнению с инспир-фазой.
 - Соматическая дисфункция доли легкого (с указанием доли) в инспир-фазе мотильности — дисфункция, при которой наблюдается преобладание движения доли легкого в инспир-фазе мотильности по сравнению с экспир-фазой.
- **Соматические дисфункции плевры**
 - Соматическая дисфункция плевры — ограничение подвижности плевры (с указанием зоны) при диафрагмальном вдохе.
- **Соматические дисфункции средостения**
 - Соматическая дисфункция органов средостения в правой ротации — дисфункция, при которой преобладает движение объема средостения в правой ротации относительно вертикальной оси.
 - Соматическая дисфункция органов средостения в левой ротации — дисфункция, при которой преобладает движение объема средостения в левой ротации относительно вертикальной оси.
 - Соматическая дисфункция органов средостения в правом боковом наклоне — дисфункция, при которой преобладает движение объема средостения в правый боковой наклон относительно переднезадней оси.
 - Соматическая дисфункция органов средостения в левом боковом наклоне — дисфункция, при которой преобладает движение объема средостения в левый боковой наклон относительно переднезадней оси.
 - Соматическая дисфункция органов средостения во флексии — дисфункция, при которой преобладает движение переднего наклона объема средостения относительно горизонтальной оси.
 - Соматическая дисфункция органов средостения в экстензии — дисфункция, при которой преобладает движение заднего наклона объема средостения относительно горизонтальной оси.
 - Сочетанная соматическая дисфункция органов средостения — дисфункция, которая включает две и более дисфункции (с указанием направлений дисфункций).
 - Соматические дисфункции перикарда (дисфункции, характеризующиеся напряжением связок перикарда) — нарушение мобильности перикарда.
 - Соматическая дисфункция вертеброперикардиальной связки — напряжение вертеброперикардиальной связки.
 - Соматическая дисфункция верхней грудино-перикардиальной связки — напряжение верхней грудино-перикардиальной связки.
 - Соматическая дисфункция нижней грудино-перикардиальной связки — напряжение нижней грудино-перикардиальной связки.
 - Соматическая дисфункция диафрагмально-перикардиальной связки — напряжение диафрагмально-перикардиальной связки.
 - Сочетанная соматическая дисфункция — дисфункция, которая включает две и более соматических дисфункции: напряжение двух и более связок перикарда.
- **Соматические дисфункции желудка**
 1. Ограничение мобильности желудка.
 - Соматическая дисфункция желудка в правом боковом наклоне — дисфункция, при которой преобладает движение правого бокового наклона желудка относительно переднезадней оси.

- Соматическая дисфункция желудка в левом боковом наклоне — дисфункция, при которой преобладает движение левого бокового наклона желудка относительно переднезадней оси.
 - Соматическая дисфункция желудка в правой ротации — дисфункция, при которой преобладает правая ротация желудка относительно вертикальной оси.
 - Соматическая дисфункция желудка в левой ротации — дисфункция, при которой преобладает левая ротация желудка относительно вертикальной оси.
 - Соматическая дисфункция желудка по типу птоза — дисфункция, при которой преобладает подвижность желудка в каудальном направлении.
 - Соматическая дисфункция желудка в верхнем направлении при наличии грыжи пищеводного отверстия грудобрюшной диафрагмы — дисфункция, при которой преобладает подвижность желудка в краниальном направлении.
 - Сочетанная соматическая дисфункция желудка — дисфункция, которая включает две и более соматических дисфункции (с указанием направления дисфункций).
 - Соматическая дисфункция — спазм пилорического сфинктера.
2. Ограничение мотильности желудка.
- Соматическая дисфункция желудка в экспир-фазе мотильности — дисфункция, при которой наблюдается преобладание движения желудка в экспир-фазе мотильности по сравнению с инспир-фазой.
 - Соматическая дисфункция желудка в инспир-фазе мотильности — дисфункция, при которой наблюдается преобладание движения желудка в инспир-фазе мотильности по сравнению с экспир-фазой.
- Соматические дисфункции печени
1. Ограничение мобильности печени.
- Соматическая дисфункция печени в правом боковом наклоне — дисфункция, при которой преобладает движение правого бокового наклона печени относительно переднезадней оси.
 - Соматическая дисфункция печени в левом боковом наклоне — дисфункция, при которой преобладает движение левого бокового наклона печени относительно переднезадней оси.
 - Соматическая дисфункция печени в правой ротации — дисфункция, при которой преобладает правая ротация печени относительно вертикальной оси.
 - Соматическая дисфункция печени в левой ротации — дисфункция, при которой преобладает левая ротация печени относительно вертикальной оси.
 - Соматическая дисфункция печени по типу птоза — дисфункция, при которой преобладает подвижность печени в каудальном направлении.
 - Соматическая дисфункция печени в верхнем направлении — дисфункция, при которой преобладает подвижность печени в краниальном направлении.
 - Сочетанная соматическая дисфункция печени — дисфункция, которая включает две и более соматических дисфункции (с указанием направления дисфункций).
2. Нарушение мотильности печени.
- Соматическая дисфункция печени в экспир-фазе мотильности — дисфункция, при которой наблюдается преобладание движения печени в экспир-фазе мотильности по сравнению с инспир-фазой.
 - Соматическая дисфункция печени в инспир-фазе мотильности — дисфункция, при которой наблюдается преобладание движения печени в инспир-фазе мотильности по сравнению с экспир-фазой.
 - Соматические дисфункции связок печени.
 - Соматическая дисфункция правой треугольной связки печени — напряжение правой треугольной связки печени.

- Соматическая дисфункция левой треугольной связки печени — напряжение левой треугольной связки печени.
- Соматическая дисфункция венечной связки печени — напряжение венечной связки печени.
- Соматическая дисфункция серповидной связки печени — напряжение серповидной связки печени.
- Соматическая дисфункция круглой связки печени — напряжение круглой связки печени.
- Соматическая дисфункция печеночно-двенадцатиперстной связки — напряжение печеночно-двенадцатиперстной связки.
- Соматическая дисфункция печеночно-желудочной связки — напряжение печеночно-желудочной связки.
- Соматическая дисфункция печеночно-ободочной связки — напряжение печеночно-ободочной связки.
- Соматическая дисфункция печеночно-почечной связки — напряжение печеночно-почечной связки.
- Сочетанная соматическая дисфункция — дисфункция, которая включает две и более соматических дисфункции — напряжение двух и более связок печени.
- **Соматические дисфункции двенадцатиперстной кишки**
 1. Нарушение мобильности.
 - Соматическая дисфункция двенадцатиперстной кишки — ограничение подвижности двенадцатиперстной кишки.
 - Соматическая дисфункция сфинктера Одди — нарушение тонуса сфинктера Одди.
 2. Нарушение мотильности.
 - Соматическая дисфункция двенадцатиперстной кишки в экспир-фазе мотильности — дисфункция, при которой наблюдается преобладание движения двенадцатиперстной кишки в экспир-фазе мотильности по сравнению с инспир-фазой.
 - Соматическая дисфункция двенадцатиперстной кишки в инспир-фазе мотильности — дисфункция, при которой наблюдается преобладание движения двенадцатиперстной кишки в инспир-фазе мотильности по сравнению с экспир-фазой.
- **Соматические дисфункции тощей кишки**
 1. Нарушение мобильности.
 - Соматическая дисфункция тощей кишки в нижнем положении — птоз — дисфункция, при которой преобладает подвижность/смещаемость тощей кишки в каудальном направлении.
 - Соматическая дисфункция дуоденоеюнального сочленения — ограничение подвижности дуоденоеюнального сочленения.
 2. Нарушение мотильности.
 - Соматическая дисфункция тощей кишки в экспир-фазе мотильности — дисфункция, при которой наблюдается преобладание движения тощей кишки в экспир-фазе мотильности по сравнению с инспир-фазой.
 - Соматическая дисфункция тощей кишки в инспир-фазе мотильности — дисфункция, при которой наблюдается преобладание движения тощей кишки в инспир-фазе мотильности по сравнению с экспир-фазой.
 - Соматические дисфункции подвздошной кишки и илеоцекальной зоны.
 - Соматическая дисфункция подвздошной кишки в нижнем положении — дисфункция, при которой преобладает подвижность/смещаемость подвздошной кишки в каудальном направлении. Дисфункция сопровождается изменением илеоцекального угла.
 - Соматическая дисфункция сфинктера баугиниевой заслонки — нарушение тонуса сфинктера баугиниевой заслонки.

- **Соматические дисфункции слепой кишки**
 1. Нарушение мобильности (спазм, фиксация).
 - Соматическая дисфункция слепой кишки в нижнем положении — дисфункция, при которой преобладает подвижность/смещаемость слепой кишки в каудальном направлении.
 - Соматическая дисфункция слепой кишки в правой подвздошной области — фиксация слепой кишки в правой подвздошной области.
 2. Нарушение мотильности.
 - Соматическая дисфункция слепой кишки в экспир-фазе мотильности — дисфункция, при которой наблюдается преобладание движения слепой кишки в экспир-фазе мотильности по сравнению с инспир-фазой.
 - Соматическая дисфункция слепой кишки в инспир-фазе мотильности — дисфункция, при которой наблюдается преобладание движения слепой кишки в инспир-фазе мотильности по сравнению с экспир-фазой.
- **Соматические дисфункции восходящей и нисходящей ободочной кишки**
 1. Нарушение мобильности (фиксация, спазм).
 - Соматическая дисфункция восходящей (нисходящей) ободочной кишки — ограничение латерального смещения восходящей (нисходящей) ободочной кишки — дисфункция, при которой преобладает медиальное смещение восходящей (нисходящей) ободочной кишки.
 - Соматическая дисфункция восходящей (нисходящей) ободочной кишки — ограничение медиального смещения восходящей (нисходящей) ободочной кишки — дисфункция, при которой преобладает латеральное смещение восходящей (нисходящей) ободочной кишки.
 2. Нарушение мотильности.
 - Соматическая дисфункция восходящей (нисходящей) ободочной кишки в экспир-фазе мотильности — дисфункция, при которой наблюдается преобладание движения восходящей (нисходящей) ободочной кишки в экспир-фазе мотильности по сравнению с инспир-фазой.
 - Соматическая дисфункция восходящей (нисходящей) ободочной кишки в инспир-фазе мотильности — дисфункция, при которой наблюдается преобладание движения восходящей (нисходящей) ободочной кишки в инспир-фазе мотильности по сравнению с экспир-фазой.
- **Соматические дисфункции сигмовидной кишки**
 1. Нарушение мобильности (фиксация, спазм).
 - Соматическая дисфункция сигмовидной кишки — ограничение подвижности сигмовидной кишки.
 - Соматическая дисфункция сигмовидной кишки в нижнем положении — дисфункция, при которой преобладает подвижность/смещаемость сигмовидной кишки в каудальном направлении.
 2. Нарушение мотильности.
 - Соматическая дисфункция сигмовидной кишки в экспир-фазе мотильности — дисфункция, при которой наблюдается преобладание движения сигмовидной кишки в экспир-фазе мотильности по сравнению с инспир-фазой.
 - Соматическая дисфункция сигмовидной кишки в инспир-фазе мотильности — дисфункция, при которой наблюдается преобладание движения сигмовидной кишки в инспир-фазе мотильности по сравнению с экспир-фазой.
- **Соматические дисфункции прямой кишки**

Нарушение мобильности (фиксация, спазм).

 - Соматическая дисфункция прямой кишки в нижнем положении — дисфункция, при которой преобладает подвижность/смещаемость стенки прямой кишки в каудальном направлении.

- **Соматические дисфункции почек**

1. Нарушение мобильности (фиксация, птоз).

- Соматическая дисфункция почки в нижнем положении — дисфункция, при которой во время диафрагмального вдоха преобладает каудальное смещение почки.
- Соматическая дисфункция «замороженная почка» — дисфункция, при которой резко ограничено движение почки на фазах диафрагмального дыхания.

2. Нарушение мотильности.

- Соматическая дисфункция почки в экспир-фазе мотильности — дисфункция, при которой наблюдается преобладание движения почки в экспир-фазе мотильности по сравнению с инспир-фазой.
- Соматическая дисфункция почки в инспир-фазе мотильности — дисфункция, при которой наблюдается преобладание движения почки в инспир-фазе мотильности по сравнению с экспир-фазой.

- **Соматические дисфункции мочевого пузыря**

1. Нарушение мобильности (фиксация, спазм, птоз).

- Соматическая дисфункция мочевого пузыря в правом боковом наклоне — дисфункция, при которой преобладает движение правого бокового наклона мочевого пузыря относительно переднезадней оси.
- Соматическая дисфункция мочевого пузыря в левом боковом наклоне — дисфункция, при которой преобладает движение левого бокового наклона мочевого пузыря относительно переднезадней оси.
- Соматическая дисфункция мочевого пузыря в правой ротации — дисфункция, при которой преобладает правая ротация мочевого пузыря относительно вертикальной оси.
- Соматическая дисфункция мочевого пузыря в левой ротации — дисфункция, при которой преобладает левая ротация мочевого пузыря относительно вертикальной оси.
- Соматическая дисфункция мочевого пузыря по типу птоза — дисфункция, при которой преобладает подвижность/смещаемость мочевого пузыря в каудальном направлении.
- Соматическая дисфункция мочевого пузыря в верхнем положении — дисфункция, при которой преобладает подвижность/смещаемость мочевого пузыря в краниальном направлении.
- Сочетанная соматическая дисфункция мочевого пузыря — дисфункция, которая включает две и более соматических дисфункции (с указанием направления дисфункций).

2. Нарушение мотильности.

- Соматическая дисфункция мочевого пузыря в экспир-фазе мотильности — дисфункция, при которой наблюдается преобладание движения мочевого пузыря в экспир-фазе мотильности по сравнению с инспир-фазой.
- Соматическая дисфункция мочевого пузыря в инспир-фазе мотильности — дисфункция, при которой наблюдается преобладание движения мочевого пузыря в инспир-фазе мотильности по сравнению с экспир-фазой.

- **Соматические дисфункции матки**

1. Нарушение мобильности (фиксации, птоз, спазм).

- Соматическая дисфункция матки — ретрофлексия матки — задний наклон тела матки относительно горизонтальной оси с сохранением маточно-шеечного угла.
- Соматическая дисфункция матки — ретроверсия матки — задний наклон тела матки относительно горизонтальной оси с изменением маточно-шеечного угла.
- Соматическая дисфункция матки — латерофлексия матки — боковой наклон тела матки относительно переднезадней оси (с указанием направления наклона) с сохранением маточно-шеечного угла.

- Соматическая дисфункция матки — латероверсия матки — боковой наклон тела матки относительно переднезадней оси (с указанием направления наклона) с изменением маточно-шеечного угла.
- Соматическая дисфункция матки — опущение матки — дисфункция, при которой преобладает подвижность/смещаемость матки в каудальном направлении.
- Соматическая дисфункция матки — смещение матки в верхнем положении — дисфункция, при которой преобладает подвижность/смещаемость матки в краниальном направлении.
- Сочетанная соматическая дисфункция матки — дисфункция, которая включает две и более соматических дисфункции (с указанием направления дисфункции).

2. Нарушение мотильности матки.

- Соматическая дисфункция матки в экспир-фазе мотильности — дисфункция, при которой наблюдается преобладание движения матки в экспир-фазе мотильности по сравнению с инспир-фазой.
- Соматическая дисфункция матки в инспир-фазе мотильности — дисфункция, при которой наблюдается преобладание движения матки в инспир-фазе мотильности по сравнению с экспир-фазой.

1.6. Клиническая картина заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

Согласно одному из определений, болезнь — это жизнь, нарушенная в своем течении повреждением структуры и функции организма под влиянием внешних и внутренних факторов при мобилизации его компенсаторно-приспособительных механизмов. Можно утверждать, что любая болезнь имеет как функциональную, так и структурную составляющую.

Нарушения структуры и функции могут быть: обратимыми, частично обратимыми, необратимыми. Соматическая дисфункция — это обратимое структурно-функциональное нарушение в тканях и органах. Нарушение структуры обусловлено: изменениями в системе СТ, в соотношении разных видов коллагена, а также коллагена и эластина (биомеханика); изменениями качественных характеристик жидкостей организма и их движения (гидродинамика); затруднениями проведения нервного сигнала (нейродинамика). СД могут выявляться как при наличии, так и при отсутствии явных признаков заболевания. В результате процессов адаптации и компенсации, а также при их нарушениях (при дезадаптации и декомпенсации) формирующаяся в организме СД в ряде случаев может вызвать различные клинические проявления, которые могут не совпадать с ней по локализации.

2. Диагностика заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний), медицинские показания и противопоказания к применению методов диагностики

Рекомендации сформированы по результатам проведенного систематического обзора публикаций по вопросам соматической дисфункции. Рекомендации полностью соответствуют мировым современным подходам к соматической дисфункции, однако «слабы» с позиции доказательной медицины. Это обусловлено отсутствием клинических исследований методов как диагностики, так и лечения соматической дисфункции по следующим причинам:

- 1) диагностика и лечение представляют собой непосредственное взаимодействие врача и пациента, что затрудняет их унификацию и, как следствие, изучение;
- 2) большинство проводимых исследований направлено на изучение влияния остеопатии на клинические симптомы, сопутствующие состояния при конкретных заболеваниях, состояниях (например, головная боль при мигрени, влияние на задержку речевого развития и т.д., см. также Приложение А3.2), что корректно с точки зрения доказательной медицины, однако не соответствует современным принципам остеопатии и не позволяет экстраполировать данные на всю популяцию пациентов с соматической дисфункцией.

Эти особенности, не позволяющие полноценно реализовать принципы доказательной медицины в сфере остеопатии, сегодня активно обсуждаются в мировом сообществе для разработки стандартов исследования методов остеопатии с позиции доказательной медицины.

Критерии установления диагноза/состояния: наличие патогномоничных данных:

- 1) анамнестических данных;
- 2) физикального обследования.

- Всем пациентам при подозрении на соматическую дисфункцию рекомендован прием (осмотр, консультация) врача-osteopata в целях установления диагноза и последующей коррекции выявленных соматических дисфункций [19, 20].

УДД 5 УУР С

Комментарии. Диагноз — это краткое врачебное заключение о патологическом состоянии здоровья обследуемого, об имеющихся у него заболеваниях (травмах) или причине смерти, оформленное в соответствии с действующими стандартами и выраженное в терминах, предусмотренных действующими классификациями и номенклатурой болезней.

Диагноз должен быть:

- фактически и логически обоснованным;
- структурно оформленным в виде трех унифицированных рубрик;
- нозологическим, соответствовать требованиям Международной классификации болезней, травм и состояний, влияющих на здоровье, 10-го пересмотра и номенклатуре болезней (с учетом особенностей отечественных классификаций);
- развернутым, патогенетическим, содержать дополнительную интранозологическую характеристику патологических процессов;
- клинически своевременным.

Кроме общепринятой формулировки диагноза, оформляется **osteopaticкое заключение** с указанием биомеханических, ритмогенных и нейродинамических нарушений на глобальном, региональном и локальном уровнях (табл. 2).

Таблица 2

Остеопатическое заключение

Уровень/Нарушение	Биомеханическое 1бл / 2 бл / 3бл	Ритмогенное 1 бл / 2бл /3бл	Нейродинамическое 1 бл / 2бл /3бл
Глобальный	1 2 3	Краниальное 1 2 3 Кардиальное 1 2 3 Дыхательное 1 2 3	ПВС 1 2 3 Постуральное 1 2 3
Региональный	Регион:	сома	висцера
	Головы	1 2 3	
	Шеи	1 2 3	1 2 3
	Верх. конечн.	1 2 3	
	Грудной	1 2 3	1 2 3
	Поясничный	1 2 3	1 2 3
	Таза	1 2 3	1 2 3
	Нижн. конечн.	1 2 3	
	ТМО		1 2 3
Локальный	Указываются отдельные соматические дисфункции (острые или хронические):		
Доминирующая соматическая дисфункция:			

В таблице также указывается доминирующая соматическая дисфункция, коррекция которой и будет являться логической конечной целью данного остеопатического сеанса.

Определение доминирующей соматической дисфункции подчиняется следующим принципам.

1. При заполнении остеопатического заключения и выявлении доминирующей соматической дисфункции мы ориентируемся на принцип иерархии, когда глобальные нарушения преобладают над региональными, а региональные — над локальными.
2. В случае наличия нескольких соматических дисфункций глобального или регионального уровня доминирующей, как правило, оказывается дисфункция, максимальная по степени выраженности в баллах. Если несколько соматических дисфункций равны по степени выраженности, то проводится тест ингибции, в результате которого выявляется доминирующая дисфункция.
3. Локальная соматическая дисфункция может быть отнесена к доминирующей только в случае острого повреждения. В этом случае острая локальная соматическая дисфункция преобладает над региональными и глобальными нарушениями.
4. Наряду с соматической дисфункцией глобального уровня в графу «Доминирующая соматическая дисфункция» также может быть внесена наиболее значимая региональная дисфункция. В данном случае под наиболее значимой подразумевается та региональная дисфункция, которая на момент осмотра вызывает большую дезадаптацию организма. Как правило, такая региональная дисфункция при этом имеет большую выраженность в баллах по сравнению с остальными дисфункциями.
5. Доминирующая соматическая дисфункция является вектором коррекции на остеопатическом сеансе. Соответственно, это должно быть подтверждено перечисленными техниками в графе «Лечение».

2.1. Жалобы и анамнез

- Рекомендовано обратить внимание на походку пациента, как он зашел в кабинет, сел, оценить поведение, общее психологическое состояние в целях установления диагноза [21–24].

УДД 4 УУР С

- Рекомендовано провести подробный сбор жалоб пациента в целях установления диагноза [20, 23, 25, 26].

УДД 5 УУР С

Комментарии. Сбор жалоб пациента должен производиться подробно (алгоритм сбора жалоб — см. Приложение Б2).

При выявлении жалоб важна не только их констатация, но конкретизация и детализация, например характер, интенсивность и локализация боли, их продолжительность и т. д.

При уточнении жалоб нельзя ограничиваться только сообщениями пациента, необходимо активно выявлять жалобы по органам и системам, которые могут быть вовлечены в патологический процесс, упущены пациентом, не только наблюдаемые на день осмотра, но и ранее возникавшие в его жизни.

Следует отметить, что уже на этапе выяснения жалоб проводится дифференциальная диагностика. Вопросы пациенту должны задаваться конкретно, исходя из теоретических знаний механизма развития данного субъективного симптома при том или ином заболевании.

В дальнейшем жалобы отражаются в карте пациента: вначале указываются ведущие жалобы, посиндромно относящиеся к основному заболеванию, а только затем остальные, не укладывающиеся в его клиническую картину.

Расспрос по органам и системам начинается с той системы, поражение которой доминирует в клинической картине (см. Приложение Г1).

- Рекомендовано в целях установления диагноза подробно в хронологическом порядке собрать и описать анамнез заболевания (*Anamnesis morbi*) — возникновение, течение и развитие настоящего заболевания от первых его признаков до момента обращения к врачу-osteопату [20, 23, 25, 26].

УДД 5 УУР С

Комментарии. Под настоящим заболеванием следует понимать основное заболевание (болезненное состояние, послужившее причиной обращения к врачу). Картина истории настоящего заболевания должна формироваться у врача-osteопата в результате расспроса пациента, лиц. его сопровождающих, а также анализа данных медицинской документации (выписки из историй болезни или карты амбулаторного больного, консультативные заключения, данные лабораторных и инструментальных методов обследования и т. д.).

Указываются данные об обстоятельствах возникновения заболевания, первых его проявлениях, динамике начальных симптомов, особенностях течения заболевания и длительности ремиссий, возникших осложнениях, предшествующем лечении и его эффективности, ранее проводимых диагностических мероприятиях и их результатах, а также трудоспособность за период заболевания.

Примерная схема наиболее часто задаваемых вопросов.

1. В течение какого времени считает себя больным?
2. С появлением каких признаков (симптомов или синдромов) началось настоящее заболевание? Где и при каких обстоятельствах впервые появились данные признаки (жалобы)?
3. Какие факторы, на Ваш взгляд, способствовали началу болезни?
4. Когда и где имело место первое обращение к врачу? Каковы результаты проводившихся исследований, характер и результаты проводившегося тогда лечения?
5. Последующее течение заболевания:
 - а) динамика начальных симптомов, появление новых симптомов;
 - б) частота обострений, длительность ремиссий, осложнения заболевания;
 - в) госпитализации в стационар по данному поводу;
 - г) применявшиеся лечебные мероприятия (медикаментозные и немедикаментозные), результаты диагностических исследований, эффективность ранее проводимого лечения;
 - д) трудоспособность за период заболевания.
6. Когда и в связи с чем наступило настоящее ухудшение состояния?
7. Каковы результаты проводившегося лечения и обследования (если они были)?
8. Мотив обращения к врачу-osteопату.

Необходимо помнить, что истинное начало заболевания может намного предшествовать тому периоду, когда у пациента появляются первые признаки болезни.

- Рекомендовано в целях установления диагноза собрать и описать подробный анамнез жизни пациента (*Anamnesis vitae*) [20, 23, 25, 26].

УДД 5 УУР С

Комментарии. Проводится сбор следующих сведений.

1. Краткие сведения о психическом и умственном развитии: как рос и развивался в детстве, образование, начало трудовой деятельности, отношение к военной службе, занятия спортом.
2. Бытовые условия: в детстве, в настоящее время.
3. Условия питания: режим и регулярность, разнообразие пищи, диета, увлечение соленым, сладким и т. д.

4. Трудовой анамнез: с какого возраста, кем и где начал работать. Дальнейшая трудовая деятельность в хронологической последовательности (при необходимости с указанием мест работы и должностей). Условия и режим труда (ночные смены, пребывание на сквозняке, длительное статическое напряжение, физическое и психоэмоциональное напряжение, температурный режим и т. п.). Профессиональные вредности.
5. Вредные привычки: курение (с какого возраста, в каком количестве), употребление алкоголя, наркотических веществ, крепкого чая, кофе, пристрастие к некоторым лекарственным веществам (кофеин, фенацетин, транквилизаторы).
6. Перенесенные заболевания: в хронологической последовательности излагаются все перенесенные заболевания, операции, травмы, ранения, контузии с указанием возраста пациента, длительности и тяжести этих заболеваний, их осложнений и проводившегося лечения. Отметить, переливалась ли ранее кровь и кровезаменители, были ли реакции на переливание. Выясняются иммунологические данные: сделанные прививки (какие, когда, сколько раз, время последней прививки); введение сывороток; перенесенные в прошлом инфекционные заболевания.
7. Аллергологический анамнез: непереносимость пищевых продуктов, различных медикаментов, сывороток, наличие аллергических реакций (вазомоторный ринит, крапивница, отёк Квинке, полиноз).
8. Семейное положение: наличие детей, состояние здоровья членов семьи (жены/мужа, детей).
9. Наследственность: сведения о здоровье близких родственников, перенесённых ими заболеваниях (психических, эндокринных, сердечно-сосудистых, онкологических, инфекционных); сведения о причинах смерти родственников (отца, матери, бабушки, дедушки, тётей, дядей, братьев, сестёр и их детей).
10. Эпидемиологический анамнез. Он имеет наводящее значение при подозрении на инфекционное заболевание. Эпидемиологический анамнез преследует цель выявить возможный источник инфекции, пути заражения, иммунный статус. При сборе эпидемиологического анамнеза выявляют наличие контакта с инфекционными больными (дома, у соседей, на работе; контакт с лихорадящими больными). Следует уточнить, не было ли случаев инфекционных заболеваний в доме, во дворе, ближайшем окружении. Пребывание в дороге, в разъездах, контакт с приезжими лицами, проживание в эпидемически неблагоприятной местности в последнее время. Контакт с больными животными, уход за животными, участие в охоте, пребывание за границей; характер трудовой деятельности. При наличии контакта необходимо выяснить кто болел, когда, какой был контакт (кратковременный, длительный, в каком периоде болезни).
11. Экспертно-трудоустройственный анамнез: пребывание на листе нетрудоспособности за последний год; наличие группы инвалидности, причины и продолжительность. При сборе анамнеза у ребенка или его законного представителя необходимо обратить внимание на следующее:
 - к важным вопросам для выявления жалоб у ребенка со стороны нервной системы относятся вопросы, касающиеся сна и процесса засыпания, характера ребенка, особенностей его поведения, эмоционального состояния (плаксивость, резкая смена настроения, раздражительность и т. д.), успеваемости в школе, памяти, усидчивости, метеозависимости; для ребенка первых месяцев жизни важно уточнить, нет ли нарушений сосания груди или бутылочки (затрудненное, вялое сосание, попёрхивания, быстро устает); также важным вопросом на первом году жизни является соответствие возрастным нормативам двигательной активности и психоэмоционального развития ребенка (задержки развития); в более старшем возрасте важно обращать внимание на задержки речевого развития, дислалии, дисграфии;

- к особенностям жалоб со стороны органов дыхания можно отнести различные виды нарушений дыхания, такие как эпизоды апноэ, врожденный стридор, дыхательная аритмия, одышка, тахипноэ;
 - к особенностям жалоб со стороны органов пищеварения у детей первого года жизни относят наличие срыгиваний, колики, повышенный метеоризм, функциональные нарушения пассажа пищи (запоры и учащенный стул), повышенное слюноотделение; особенно следует обращать внимание на состояние аппетита у ребенка любого возраста и изменение массы тела;
 - к особенностям жалоб со стороны мочеполовой системы у мальчиков, особенно первого года жизни, относят водянку яичек, крипторхизм, фимоз, паховые и пахово-мошоночные грыжи; у девочек в пубертатном периоде следует расспросить об особенностях становления менструальной функции;
 - к особенностям жалоб со стороны костно-мышечной системы относят наличие особенностей походки (в зависимости от возраста, особенно это касается детей раннего возраста, хождение «на носочках», косолапость, искривление голеней), нарушение осанки (криво сидит за столом), хруст в суставах, боли в ногах (в периоды интенсивного роста), ночные боли, невозможность длительной ходьбы (устает при длительной ходьбе, болят ноги), невозможность или неохотное выполнение каких-либо простых движений (не может лазать по различным спортивным снарядам, ходить по ступенькам, прыгать), ограничение подвижности в суставах, наличие деформаций.
- Рекомендовано в целях установления диагноза при диагностике СД у ребенка собрать и описать подробный акушерский анамнез и особенности периода новорожденности [27, 28].

УДД 4 УУР С

Комментарии. Собирается следующая информация:

- 1) от какой беременности по счету родился ребенок (исходы предыдущих беременностей), ЭКО;
- 2) как протекала данная беременность (угрозы прерывания, заболевания, в том числе урогенитальные инфекции, токсикоз первой половины, гестоз, преэклампсия, фетоплацентарная недостаточность, анемия, прием препаратов, антибиотиков, вредные привычки матери);
- 3) как протекали роды: срок в неделях (преждевременные, запоздалые), длительность первого периода родов (быстрые, стремительные, затяжные), кесарево сечение (плановое, экстренное, показания к нему), осложнения в родах (раннее излитие вод, воды с меконием, кровью, длительный безводный промежуток), пособия в родах (щипцы, вакуум-экстрактор, родостимуляция медикаментозная, механическая), положение плода (тазовое, ножное, поперечное, задний вид затылочного предлежания, лобное, лицевое), состояние пуповины (обвитие, узлы);
- 4) состояние ребенка при рождении: масса, окружность головы, закричал сразу (после стимуляции, санации ВДП), оценка по Апгар, когда приложили к груди, как прошел первый день жизни;
- 5) ранний период адаптации в родильном доме: как сосал, какие были проблемы, сделаны ли прививки, были ли осложнения, заболевания в период пребывания в родильном доме, на какие сутки выписан домой;
- 6) состояние в периоде новорожденности: заболевания, проблемы, вид вскармливания;
- 7) как рос и развивался на первом году жизни: физическое и психомоторное развитие в соответствии с нормативами, сроки и последовательность прорезывания зубов.

2.2. Физикальное обследование

Оценка общего состояния пациента основывается на объективных признаках — сознание, активность поведения, весь комплекс непосредственного исследования пациента; обязательно учитывают степень выраженности интоксикации и (или) функциональных нарушений систем организма. Окончательное заключение делается в конце объективного осмотра. Выделяют удовлетворительное, средней степени тяжести, тяжелое, крайне тяжелое состояние [20].

- Всем пациентам с подозрением на СД рекомендованы общий остеопатический осмотр (визуальный осмотр остеопатический и пальпация остеопатическая) с определением доминирующей СД в целях установления диагноза [20, 29, 30]. Алгоритм проведения остеопатического осмотра — см. Приложения Б3 и Б4.

УДД 5 УУР С

Комментарии. Осмотр кожных покровов производится сверху вниз, при этом без внимания врача не должна остаться кожа волосистой части головы, за ушными раковинами, в подмышечных впадинах, под ягодицами, в межпальцевых промежутках. Методика включает описание окраски кожи и видимой слизистой оболочки, чистоты кожи (наличие сыпи), состояние подкожных вен и венозных капилляров. Информация о состоянии сосудов выясняется при пальпаторном исследовании артериального пульса на лучевых артериях. Характеристика пульса на *a. radialis* включает комплексную оценку следующих его свойств: частота, ритмичность, напряжение, наполнение, величина и форма.

Для измерения артериального давления используется аускультативный метод, предложенный Н. С. Коротковым. Артериальное давление на обеих руках может различаться не более чем на 5–10 мм рт. ст. В диагностике ряда заболеваний имеет значение измерение давления не только на плечевой, но и на бедренной артерии. Показатели артериального давления на нижних конечностях на 20–30 мм превышают таковые на верхних. Артериальное давление на ногах может различаться между собой не более чем на 5–10 мм рт. ст.

При выслушивании легких определяют дыхательные шумы — основные и дополнительные. По соотношению выслушиваемого вдоха и выдоха определяется характер дыхания (везикулярное, жесткое и бронхиальное). Необходимо отметить и звучность дыхания — обычное, усиленное, ослабленное.

Живот обычно осматривают как в положении пациента лежа на спине, так и в положении стоя. Отмечается величина и форма живота, его участие в акте дыхания. Производится поверхностная и глубокая пальпация живота.

У детей первого года жизни важным компонентом осмотра является исследование нервной системы. Оно начинается с наблюдения за поведением ребенка, положением головы (вынужденный наклон или поворот в одну из сторон), туловища (латерофлексия, выгибание назад с запрокидыванием головы), активностью движений, их симметричностью, реакцией на окружающих. Проводится исследование двигательной функции: анализ объема пассивных и активных движений в руках, ногах в положении на спине. Важно оценить состояние тонуса конечностей (при пассивных движениях) и мышц шеи (пальпаторно).

Врач-osteopat в ходе первичного приема детей первого года жизни должен уметь оценивать безусловные рефлексы (хватательный, Моро, Бабкина, хоботковый, сосательный, поисковый, ползания по Бауэру, Робинзона, асимметричный шейный тонический, симметричный тонический шейный, опоры и автоматической ходьбы) и учитывать сроки их угасания.

На первом году жизни ребенка необходимо оценивать форму головы, состояние костей черепа, большого родничка, малых родничков, которые в норме могут быть открыты у недоношенных (их размеры, состояние краев, выбухание или западение, пульсация). Также важны

состояние швов черепа (податливость или расхождение), плотность костей (наличие размягчения), определение кефалогематомы (размеры, напряженность, изменение кожи).

У детей первого года важной составляющей состояния нервной системы является психомоторное развитие. Врач-osteopat должен уметь оценить соответствие уровня психомоторного развития возрасту ребенка.

2.3. Лабораторные диагностические исследования

Лабораторные диагностические исследования обычно не применяют для диагностики СД, однако могут быть полезны в целях исключения иных заболеваний и состояний — при проведении дифференциальной диагностики, выявления противопоказаний к лечению (см. соответствующие клинические рекомендации) [31].

2.4. Инструментальные диагностические исследования

Инструментальные диагностические исследования обычно не применяют для диагностики СД, однако могут быть полезны в целях исключения иных заболеваний и состояний — при проведении дифференциальной диагностики, выявления противопоказаний к лечению (см. соответствующие клинические рекомендации) [31].

2.5. Иные диагностические исследования

Иные диагностические исследования обычно не применяют для диагностики СД, однако могут быть полезны в целях исключения иных заболеваний и состояний — при проведении дифференциальной диагностики, выявления противопоказаний к лечению (см. соответствующие клинические рекомендации) [31].

- Взрослым пациентам с установленной(-ыми) СД рекомендована консультация врача- психиатра или медицинского психолога в целях оценки необходимости и целесообразности проведения клинико-психологического лечения [32].

УДД 1 УУР С

- Пациентам с установленной(-ыми) СД рекомендована консультация врача лечебной физкультуры в целях оценки необходимости и целесообразности назначения комплекса упражнений (лечебной физкультуры) [33].

УДД 5 УУР С

3. Лечение, включая медикаментозную и немедикаментозную терапию, диетотерапию, обезболивание, медицинские показания и противопоказания к применению методов лечения

Рекомендации сформированы по результатам проведенного систематического обзора публикаций по вопросам соматической дисфункции. Рекомендации полностью соответствуют мировым современным подходам к соматической дисфункции, однако «слабы» с позиции доказательной медицины. Это обусловлено отсутствием клинических исследований методов как диагностики, так и лечения соматической дисфункции по следующим причинам.

1. Диагностика и лечение представляют собой непосредственное взаимодействие врача и пациента, что затрудняет их унификацию и, как следствие, изучение.
2. Большинство проводимых исследований направлено на изучение влияния остеопатической коррекции на клинические симптомы, сопутствующие состояния при конкретных заболе-

ваниях, состояниях (например, головная боль при мигрени, влияние на задержку речевого развития и т.д., см. также Приложение А3.2), что корректно с точки зрения доказательной медицины, однако не соответствует современным принципам остеопатии и не позволяет экстраполировать данные на всю популяцию пациентов с соматической дисфункцией.

Эти особенности, не позволяющие полноценно реализовать принципы доказательной медицины в сфере остеопатии, сегодня активно обсуждаются в мировой сообществе для разработки стандартов исследования методов остеопатии с позиции доказательной медицины.

3.1. Остеопатическая коррекция

- Пациентам с СД рекомендована её остеопатическая коррекция. Схема лечения определяется индивидуально на основе жалоб, анамнеза, данных оценки соматического и остеопатического статусов, в соответствии с оформленным остеопатическим заключением, при этом определяется количество, характер (вид) техник и последовательность их использования на данном сеансе [24, 34–39].

УДД 1 УУР С

Комментарии. В Приложении А3.2 также представлен перечень заболеваний, при наличии которых доказана эффективность остеопатической коррекции СД.

В практике у врачей-osteопатов существует огромное количество методик и техник, правильное и избирательное применение которых помогает достичь высоких результатов. Однако правильное и избирательное применение тех или иных техник возможно только в том случае, если есть определенный порядок или алгоритм выхода на дисфункцию и ее уровень. Выполнение данных алгоритмов в ежедневной практике позволяет обеспечить пациентам долговременный и прогнозируемый положительный результат.

Основными показаниями для остеопатической коррекции (ОК) являются:

- в качестве монотерапии — наличие у пациента СД с отсутствием или минимальной выраженностью клинических проявлений (при отсутствии нозологического диагноза) и отсутствие противопоказаний к остеопатическому лечению;
- в составе комплексной терапии — при совместном ведении пациента с врачом соответствующей специальности — при всех нозологических единицах в случае отсутствия противопоказаний.

При первичном обращении пациента врач-osteопат должен выяснить, нет ли у пациента противопоказаний для ОК. Для уточнения диагноза и исключения противопоказаний врач-osteопат должен направить пациента на дополнительное обследование.

Абсолютными противопоказаниями для ОК являются:

- лихорадочные состояния;
- острые инфекционные заболевания (за исключением периода реконвалесценции);
- хронические инфекционные заболевания в фазе обострения;
- контагиозные заболевания кожи, ногтей, волос;
- злокачественные системные заболевания крови;
- кровотечение или подозрение на кровотечение;
- острая хирургическая патология;
- системные заболевания соединительной ткани в период обострения;
- острые воспалительные заболевания кровеносных и лимфатических сосудов, острый тромбоз;
- аневризма аорты и сердца;
- лёгочно-сердечная недостаточность III степени;
- гипертонический и гипотонический криз;

- острый коронарный синдром;
- черепно-мозговая травма (острый период);
- острые травматические повреждения позвоночника и суставов с нарушением целостности костных структур;
- острые нарушения мозгового и спинномозгового кровообращения (острейший период);
- острые и подострые воспалительные заболевания головного и спинного мозга и его оболочек, позвоночника и суставов;
- диагностически неясные случаи с подозрением на патологию, являющуюся противопоказанием к остеопатической коррекции;
- эндогенные психические заболевания в период обострения, экзогенные психические расстройства с чрезмерным возбуждением.

Относительные противопоказания для ОК:

- аномалии краниовертебральной зоны и шейного отдела позвоночника (в том числе аномалия Киммерли, аномалия Арнольда–Киари);
- анкилозирующий спондилоартрит (болезнь Бехтерева);
- грыжа межпозвонкового диска в области шейного отдела позвоночника в остром периоде заболевания при выраженном болевом синдроме;
- заболевания внутренних органов в стадии декомпенсации;
- остеопороз;
- злокачественные новообразования любой локализации;
- доброкачественные образования (активный рост);
- ранний послеоперационный период при хирургических вмешательствах;
- гнойные процессы любой локализации.

Стоит отметить, что вышеперечисленные заболевания и состояния являются больше противопоказанием к применению отдельных остеопатических техник и подходов, нежели остеопатической коррекции в целом.

В конце первого сеанса необходимо дать пациенту или его законному представителю подробные рекомендации по рационализации питания (диете) и двигательной активности, образу жизни, обсудить повторное посещение врача-osteopata (повторные сеансы, интервал между ними).

3.1.1. Контрольное тестирование корригируемых регионов (ре-тест)

- По завершении терапии рекомендован контрольный осмотр пациента врачом-osteopatом и тестирование тех регионов, которые он корригировал в ходе остеопатического сеанса (контрольное тестирование корригируемых регионов, ре-тест) в целях оценки динамика тестов после выполненного лечения [19, 20].

УДД 5 УУР С

3.2. Иные методы

- Взрослым пациентам с СД с длительностью течения состояния не более 1 года рекомендована когнитивно-поведенческая терапия в составе комплексной терапии (в соответствии с рекомендациями профильного специалиста) [40].

УДД 1 УУР С

- Пациентам с СД рекомендована физическая активность в составе комплексной терапии [41, 42]

УДД 5 УУР С

4. Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение, медицинские показания и противопоказания к применению методов медицинской реабилитации, в том числе основанных на использовании природных лечебных факторов

Не требуются.

5. Профилактика и диспансерное наблюдение, медицинские показания и противопоказания к применению методов профилактики

- Рекомендуется соблюдение оптимального двигательного стереотипа, принципов рационального питания с целью своевременной профилактики СД [43, 44].

УДД 5 УУР С

6. Организация оказания медицинской помощи

Порядок оказания медицинской помощи по профилю «остеопатия», требования к врачу-остеопату — см. Приложение А3.1. Также в приложении А3. 2 в ознакомительных целях представлен перечень заболеваний, при которых доказаны положительные результаты остеопатической коррекции.

6.1. Заполнение медицинской документации

В соответствии с действующей нормативно-правовой базой врач-остеопат на приеме заполняет бланк «Первичный осмотр врачом-остеопатом» или бланк «Осмотр врачом-остеопатом (наблюдение в динамике)». Данные медицинские документы являются вкладываемым в Учетную форму № 025/у, утвержденную приказом Минздрава России от 15 декабря 2014 г. № 834н.

Вкладыш «Первичный осмотр врачом-остеопатом», далее — Вкладыш-1 (см. Приложение А3.4) в Медицинскую карту пациента, получающего помощь в амбулаторных условиях, заполняется врачом-остеопатом медицинской организации (иной организации), оказывающей медицинскую помощь в амбулаторных условиях по профилю «остеопатия». Вкладыш-1 заполняется на каждого впервые обратившегося пациента. Все записи производятся на русском языке, аккуратно, все необходимые во Вкладыше-1 исправления делаются незамедлительно, подтверждаются подписью врача-остеопата, заполняющего Вкладыш-1.

Вкладыш «Осмотр врачом-остеопатом (наблюдение в динамике)» в Медицинскую карту пациента, получающего помощь в амбулаторных условиях, далее — Вкладыш-2 (см. Приложение А3.5), заполняется врачом-остеопатом медицинской организации (иной организации), оказывающей медицинскую помощь в амбулаторных условиях по профилю «остеопатия». Вкладыш-2 заполняется на каждого повторно обратившегося пациента. Вкладыш-2 заполняется при каждом повторном посещении пациента. Записи производятся на русском языке, аккуратно, все необходимые во Вкладыше-2 исправления делаются незамедлительно, подтверждаются подписью врача-остеопата, заполняющего Вкладыш-2.

6.2. Показания для госпитализации в медицинскую организацию

Отсутствуют.

7. Дополнительная информация (в том числе факторы, влияющие на исход заболевания или состояния)

Не требуется.

Критерии оценки качества медицинской помощи

Проблема оценка качества медицинской помощи в остеопатии стоит достаточно остро. Исходно постулируется максимально персонифицированный подход к каждому пациенту, что делает практически невозможным разработку универсальных протоколов остеопатической коррекции.

№	Критерии качества	Оценка выполнения (да/нет)
1	Выполнен прием (осмотр, консультация) врача-osteопата	Да/нет
2	Выполнен сбор анамнеза и жалоб у пациента и (или) его законных представителей	Да/нет
3	Выполнены визуальный осмотр остеопатический и пальпация остеопатическая	Да/нет
4	Заполнено остеопатическое заключение с определением доминирующей соматической дисфункции	Да / нет
5	Заполнен вкладыш «Первичный осмотр врачом-osteопатом» (далее — Вкладыш-1) в Медицинскую карту пациента, получающего помощь в амбулаторных условиях, при первичном приеме (осмотре, консультации) врача-osteопата	Да/нет
6	Заполнен вкладыш «Осмотр врачом-osteопатом (наблюдение в динамике)» в Медицинскую карту пациента, получающего помощь в амбулаторных условиях (далее — Вкладыш-2) в Медицинскую карту пациента, получающего помощь в амбулаторных условиях, при повторном приеме (осмотре, консультации) врача-osteопата	Да/нет
7	Соответствие проводимых лечебных манипуляций заполненному на приеме остеопатическому заключению	Да/нет

В случае, если необходимая медицинская документация заполнена своевременно и грамотно, проведенное лечение логично следует из заполненного остеопатического заключения, можно предварительно на начальном этапе сделать заключение об оказании медицинских процедур надлежащего качества.

Список литературы

1. Мохов Д. Е., Аптекарь И. А., Белаш В. О., Литвинов И. А., Могельницкий А. С., Потехина Ю. П., Тарасов Н. А., Тарасова В. В., Трегубова Е. С., Устинов А. В. Основы остеопатии: Учебник / Под ред. Д. Е. Мохова. М., 2020.
2. Потехина Ю. П., Гуричев А. А. Терминология повреждений в остеопатии и в других медицинских дисциплинах. Российский остеопатический журнал. 2021; 2: 116–127.
3. Алексеев А. А., Заворотинская Н. В. Остеохондроз, заболевания связок, суставов, мышц. М.—Пенза: ОООНПП «Гидриатика»; 2008; 148 с.
4. Омеляненко Н. П., Слуцкий Л. И. Соединительная ткань (гистофизиология и биохимия). Т. 1 / Под ред. С. П. Миронова. М.: Известия; 2009; 380 с.
5. Омеляненко Н. П., Слуцкий Л. И. Соединительная ткань (гистофизиология и биохимия). Т. 2 / Под ред. С. П. Миронова. М.: Известия; 2010; 600 с.
6. Серов В. В., Шехтер А. Б. Соединительная ткань (функциональная морфология и общая патология). М.: Медицина; 1981; 312 с.
7. Аптекарь И. А., Костоломова Е. Г., Суховей Ю. Г. Изменение функциональной активности фибробластов в процессе моделирования компрессии, гиперкапнии и гипоксии. Российский остеопатический журнал. 2019; 1–2: 72–84.
8. Гельфман М. И. Коллоидная химия: Учебник. СПб.: Лань; 2010; 336 с.
9. Zaguskin S. L. Time Life and Biosystems Sustainability. Part 1. Preservation of Biosystems Stability through Deletion or Update Its Components. Space and Time. 2012; 4 (10): 168–174.
10. Загускин С. Л. Ритмы клетки и здоровье человека. Ростов н/Дону: ЮФУ; 2010; 292 с.
11. Черниговский В. Н. Интероцепция. Л.: Наука; 1985; 413 с.
12. Denslow J. S., Korr I. M., Krems A. D. Quantitative studies of chronic facilitation in human motoneuron pools. Amer. J. Physiol. 1947; 150: 229–238.
13. Korr I. M. The collected papers of Irvin M. Korr / Ed. B. Peterson. American Academy of Osteopathy, Colorado; 1947; 322 p.
14. Van Buskirk R. L. Nociceptive reflexes and the somatic dysfunction: a model. J. Amer. Osteopath. Ass. 1990; 90 (9): 792–794, 797–809.
15. Мохов Д. Е. Основные теоретические аспекты функционирования постуральной системы. Мануал. тер. 2009; 1 (33): 76–82.
16. Мохов Д. Е., Потехина Ю. П., Трегубова Е. С., Гуричев А. А. Остеопатия — новое направление современной медицины (современная концепция остеопатии). Российский остеопатический журнал. 2022; 2: 8–26.

17. World Health Organization et al. Benchmarks for training in traditional/ complementary and alternative medicine: Benchmarks for training in osteopathy; 2010.
18. Johnson G. M. The sensory and sympathetic nerve supply within the cervical spine: review of recent observations. *Manual Ther.* 2004; 9 (2): 71–76.
19. Atchison J. W. et al. Manipulation, traction, and massage // In: Braddom's Physical Medicine and Rehabilitation. Elsevier; 2021: 316–337.
20. Beal M. C. (ed.). The principles of palpatory diagnosis and manipulative technique. Indianapolis, IN : American Academy of Osteopathy; 1989.
21. Qureshi Y. et al. Effects of somatic dysfunction on leg length and weight bearing. *J. Osteopath. Med.* 2014; 114 (8): 620–630.
22. Licciardone J. C. et al. Depression, somatization, and somatic dysfunction in patients with nonspecific chronic low back pain: results from the osteopathic Trial. *J. Osteopath. Med.* 2012; 112 (12): 783–791.
23. Егорова И. А., Кузнецова Е. Л., Бучнов А. Д. Соматические дисфункции у детей раннего возраста (диагностика и восстановительное лечение). *Рос. семейный врач.* 2007; 11 (1): 19–22.
24. Матвиенко В. В., Бучнов А. Д., Егорова И. А. Остеопатический статус и функциональное состояние организма школьников до и после остеопатической коррекции. *Физиотерапия, бальнеология и реабилитация.* 2015; 14 (4): 4–7.
25. Hensel K., ed. A Teaching Guide for Osteopathic Manipulative Medicine. Chevy Chase, MD: American Association of Colleges of Osteopathic Medicine; 2015: 1.
26. Magee D. J. Orthopedic Physical Assessment. St. Louis, MO: Saunders Elsevier; 2008: 21.
27. Waddington E. L. et al. Incidence of somatic dysfunction in healthy newborns. *J. Osteopath. Med.* 2015; 115 (11): 654–665.
28. Кузьмина Ю. О. и др. Соматические дисфункции у детей первого года жизни: особенности формирования. *Российский остеопатический журнал.* 2021; 1: 34–44.
29. Phillips D. R., Twomey L. T. A comparison of manual diagnosis with a diagnosis established by a uni-level lumbar spinal block procedure. *Manual Ther.* 1996; 1 (2): 82–87.
30. Ehrenfeuchter W. C., Kappler R. E. Palpatory examination. *Foundations of osteopathic medicine (3rd ed.)*. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 2011. p. 401e9.
31. William R. Y. et al. Somatic Symptom Disorders Workup. URL: <https://emedicine.medscape.com/article/294908-workup>
32. Berezowski L. et al. Early Psychological Interventions for Somatic Symptom Disorder and Functional Somatic Syndromes: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Psychosom. Med.* 2022; 84 (3): 325–338.
33. Strachan W. F. Physical activity as an aid to osteopathic manipulative treatment. *J. Amer. Osteopath. Ass.* 1964; 63: 709–716.
34. Licciardone J. C. et al. Osteopathic manual treatment in patients with diabetes mellitus and comorbid chronic low back pain: subgroup results from the osteopathic Trial. *J. Osteopath. Med.* 2013; 113 (6): 468–478.
35. Granger F. et al. Assessment of shoulder pain and somatic dysfunction in young competitive swimmers: Preventive Osteopathic Manipulative Treatment; 2019.
36. Vismara L. et al. Osteopathic manipulative treatment in obese patients with chronic low back pain: a pilot study. *Manual Ther.* 2012; 17 (5): 451–455.
37. Bagagiolo D., Rosa D., Borrelli F. Efficacy and safety of osteopathic manipulative treatment: an overview of systematic reviews. *Brit. med. J. Open.* 2022; 12 (4): e053468.
38. Dal Farra F. et al. Effectiveness of osteopathic interventions in chronic non-specific low back pain: A systematic review and meta-analysis. *Complement. Ther. Med.* 2021; 56: 102616.
39. Lanaro D. et al. Osteopathic manipulative treatment showed reduction of length of stay and costs in preterm infants: A systematic review and meta-analysis. *Medicine.* 2017; 96 (12): 45.
40. Berezowski L. et al. Early Psychological Interventions for Somatic Symptom Disorder and Functional Somatic Syndromes: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Psychosom. Med.* 2022; 84 (3): 325–338.
41. Vismara L. et al. Osteopathic manipulative treatment in obese patients with chronic low back pain: a pilot study. *Manual Ther.* 2012; 17 (5): 451–455.
42. Strachan W. F. Physical activity as an aid to osteopathic manipulative treatment. *J. Amer. Osteopath. Ass.* 1964; 63: 709–716.
43. Потехина Ю. П. Патогенез соматических дисфункций (локальный и региональный уровни). *Российский остеопатический журнал.* 2016; 3–4: 91–104.
44. Licciardone J. C. et al. A case-control study of osteopathic palpatory findings in type 2 diabetes mellitus. *Osteopath. Med. Prim. Care.* 2007; 1 (1): 1–12.
45. Franke H., Franke J. D., Fryer G. Osteopathic manipulative treatment for nonspecific low back pain: a systematic review and meta-analysis. *BMC Musculoskelet. Disord.* 2014; 15 (1): 286.
46. Licciardone J. C., Brimhall A. K., King L. N. Osteopathic manipulative treatment for low back pain: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *BMC Musculoskelet. Disord.* 2005; 4 (6): 43.
47. Licciardone J. C., Kearns C. M., Minotti D. E. Outcomes of osteopathic manual treatment for chronic low back pain according to baseline pain severity: Results from the osteopathic Trial. *Manual Ther.* 2013; 18 (6): 533–540.

48. Licciardone J.C., Gatchel R.J., Aryal S. Recovery from Chronic Low Back Pain After Osteopathic Manipulative Treatment: A Randomized Controlled Trial. *J. Amer. Osteopath. Ass.* 2016; 116 (3): 144–155.
49. Schwerla F., Rother K., Rother D., Ruetz M., Resch K.-L. Osteopathic Manipulative Therapy in Women with Postpartum Low Back Pain and Disability: A Pragmatic Randomized Controlled Trial. *J. Amer. Osteopath. Ass.* 2015; 115: 416–425.
50. Haller H., Lauche R., Cramer H., Rampp T., Saha F.J., Ostermann T., Dobos G. Craniosacral Therapy for the Treatment of Chronic Neck Pain: A Randomized Sham-controlled Trial. *Clin J. Pain.* 2016; 32 (5): 441–449.
51. McReynolds T.M., Sheridan B.J. Intramuscular Ketorolac Versus Osteopathic Manipulative Treatment in the Management of Acute Neck Pain in the Emergency Department: A Randomized Clinical Trial. *J. Amer. Osteopath. Ass.* 2005; 105 (2): 57–68.
52. Martins W.R., Blasczyk J.C., Furlan de Oliveira M.A., Gonsalves K.F.L., Bonini-Rocha A.C., Dugailly P.-M., de Oliveira R. Efficacy of musculoskeletal manual approach in the treatment of temporomandibular joint disorder: A systematic review with metaanalysis. *J. Manual Ther.* 2016; 21: 10–17.
53. Козлова Н.С., Амелин А.В. Эффективность дополнительных методов лечения постинсультной периартропатии плечевого сустава. *Российский остеопатический журнал.* 2019; 1–2: 34–42.
54. Березутская И.Н., Мирошниченко Д.Б. Клинико-функциональная эффективность реабилитации больных с консолидированным переломом лучевой кости остеопатическими методами. *Российский остеопатический журнал.* 2016; 1–2: 56–59.
55. Богачев А.А., Кутузов И.А. Обоснование применения остеопатической коррекции в комплексной реабилитации больных с консолидированными переломами большого бугорка плечевой кости. *Российский остеопатический журнал.* 2019; 3–4: 80–87.
56. Антонова Ю.В., Искандаров А.М., Мизонова И.Б. Результаты остеопатической коррекции у пациентов с посттравматической кокцигодинией. *Российский остеопатический журнал.* 2019; 1–2: 19–27.
57. Алексеев В.Н., Науменко Е.Ю. Влияние остеопатической коррекции на восстановление функций голеностопного сустава при частичном повреждении его связок. *Российский остеопатический журнал.* 2019; 1–2: 28–33.
58. Новиков Ю.О., Мохов Д.Е., Амиг Ж.-П., Мусина Г.М., Шаяхметов А.Р. Рандомизированное контролируемое исследование эффективности остеопатической манипуляционной терапии при мышечной кривошее вследствие родовой травмы. *Российский остеопатический журнал.* 2019; 1–2: 6–18.
59. Keklice H., Uygur F.A randomized controlled study on the efficiency of soft tissue mobilization in babies with congenital muscular torticollis. *J. Back. Musculoskelet Rehab.* 2017; Sep. (8).
60. Матвеев Д.В., Фролов В.А. Остеопатическое лечение дисплазии тазобедренного сустава у детей в возрасте до одного года. *Российский остеопатический журнал.* 2013; 1–2: 49–57.
61. Мохов Д.Е., Ширяева Е.Е., Стамболцян О.В., Стамболцян В.О. Остеопатическая диагностика и лечение дисплазии тазобедренных суставов и подвывихов тазобедренных суставов у детей первого полугодия жизни в условиях ортопедического отделения. *Российский остеопатический журнал.* 2015; 1–2: 15–24.
62. Фабристов Н.А., Гайнуллин И.Р. Исследование возможной эффективности остеопатической коррекции в составе комплексного лечения детей первого года жизни с дисплазией тазобедренных суставов. *Российский остеопатический журнал.* 2021; 4: 39–49.
63. Гаврик Ю.Н., Маркелова Ю.Ю., Кузьмина Ю.О. Диагностика и коррекция соматических дисфункций у детей первого полугодия жизни с врожденной патологией тазобедренных суставов. *Российский остеопатический журнал.* 2018; 3–4: 56–63.
64. Камалетдинов В.Л., Камалетдинова О.В., Сафин Р.Ф. Исследование эффективности остеопатической коррекции в лечении пациентов детского возраста с идиопатическим сколиозом I степени. *Российский остеопатический журнал.* 2022; 1: 23–34.
65. Банных Н.И. Сравнительный анализ результатов лечения плоскостопия стандартными и остеопатическими методами. *Российский остеопатический журнал.* 2017; 1–2: 61–66.
66. Валиев К.Р., Вильданов И.Х., Зиятдинов Р.Р., Гайнуллин И.Р. Результаты остеопатической коррекции у детей и подростков с недифференцированной дисплазией соединительной ткани. *Российский остеопатический журнал.* 2022; 1: 49–59.
67. Cerritelli F., Ginevri L., Messi G., Caprari E., Di Vincenzo M., Renzetti C., Cozzolino V., Barlafante G., Foschi N., Provinciali L. Clinical effectiveness of osteopathic treatment in chronic migraine: 3-armed randomized controlled trial. *Complement. Ther. Med.* 2015; 23 (2): 149–156.
68. Rolle G., Tremolizzo L., Somalvico F., Ferrarese C., Bressan L. C. Pilot trial of osteopathic manipulative therapy for patients with frequent episodic tension-type headache. *J. Amer. Osteopath. Ass.* 2014; 114 (9): 678–685.
69. Белаш В.О., Брук И.И. Общее остеопатическое лечение в терапии пациентов с хронической головной болью напряжения. *Российский остеопатический журнал.* 2020; 1–2: 18–27.
70. Кошенкова Е.Д., Белаш В.О. Возможности остеопатической коррекции компрессионно-ишемической невропатии срединного нерва в области запястного канала. *Российский остеопатический журнал.* 2015; 3–4: 59–67.
71. Кузьмина Ю.О., Гореликова Е.А., Гусина Е.Н. Оценка эффективности применения остеопатического лечения у грудных детей 3–9 месяцев с задержкой моторного развития на фоне перинатального поражения нервной системы. *Российский остеопатический журнал.* 2016; 3–4: 59–68.

72. Токарева Н.П., Мохова Е.С., Кузьмина Ю.О. Остеопатический подход в коррекции двигательных нарушений при перинатальных поражениях ЦНС гипоксически-ишемического генеза у детей в раннем восстановительном периоде. Российский остеопатический журнал. 2016; 1–2: 14–21.
73. Смирнов В.А., Саматов А.Ф., Кузьмина Ю.О. Остеопатическая коррекция соматических дисфункций у детей 1 года жизни с гипертензионным синдромом. Российский остеопатический журнал. 2016; 3–4: 45–51.
74. Кузнецова Е.А., Гулькевич О.С. Дизартрические проявления задержки предречевого развития детей первого года жизни, связанные с родовой травмой краниовертебрального перехода. Российский остеопатический журнал. 2014; 1–2: 29–36.
75. Duncan B., McDonough-Means S., Worden K., Schnyer R., Andrews J., Meaney F. Effectiveness of Osteopathy in the Cranial Field and Myofascial Release Versus Acupuncture as Complementary Treatment for Children with Spastic Cerebral Palsy: A Pilot Study. J. Amer. Osteopath. Ass. 2008; 108 (10): 559–570.
76. Абрамова Е.В., Аптекарь И.А. Остеопатическая коррекция соматических дисфункций у детей дошкольного возраста с задержкой речевого развития. Российский остеопатический журнал. 2019; 3–4: 54–61.
77. Attali T.V., Bouchoucha M., Benamouzig R. Treatment of refractory irritable bowel syndrome with visceral osteopathy: short-term and long-term results of a randomized trial. J. Dig. Dis. 2013; 14 (12): 654–661.
78. Muller A., Franke H., Resch K.L., Fryer G. Effectiveness of osteopathic manipulative therapy for managing symptoms of irritable bowel syndrome: a systematic review. J. Amer. Osteopath. Ass. 2014; 114 (6): 470–479.
79. Мохов Д.Е., Глыбовский Э.Е. Электрогастроэнтерография как метод объективизации остеопатического воздействия в лечении пациентов с синдромом раздраженного кишечника. Российский остеопатический журнал. 2012; 3–4: 32–37.
80. Brugman R., Fitzgerald K., Fryer G. The effect of Osteopathic Treatment on Chronic Constipation — A Pilot Study. Int. J. Osteopath. Med. 2010; 13 (Iss. 1): 17–23.
81. Налётова Т.П., Удинцев Е.П., Орешко А.Ю., Чусовитина О.А. Эффективность остеопатической коррекции в комплексном лечении взрослых пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью. Российский остеопатический журнал. 2021; 1: 69–79.
82. Фазлыяхметов Р.Т., Сафиуллин Р.Р., Устинов А.В. Результаты включения остеопатической коррекции в состав комплексной терапии пациентов с хроническим гастритом. Российский остеопатический журнал. 2021; 1: 80–89.
83. Franke H., Hoesele K. Osteopathic manipulative treatment (OMT) for lower urinary tract symptoms (LUTS) in women. J. Bodyw. Mov. Ther. 2013; 17 (1): 11–18.
84. Беляева А.В., Лебедев Д.С. Оценка эффективности остеопатического лечения в комплексной терапии нейрогенных дисфункций мочевого пузыря, осложнённых хроническим буллезным циститом и пузырно-мочеточниковыми рефлюксами у детей младшего школьного возраста. Российский остеопатический журнал. 2015; 1–2: 35–42.
85. Ненашкина Э.Н. Влияние остеопатической коррекции на психоэмоциональное состояние и качество жизни беременных с сопутствующей патологией мочевыводящей системы. Российский остеопатический журнал. 2020; 1–2: 66–74.
86. Кусевич М.Н., Новосельцев С.В., Вавилов М.П. Диагностика и остеопатическое лечение синдрома сдавления верхней апертуры грудной клетки у больных после радикального лечения рака молочной железы. Российский остеопатический журнал. 2012; 3–4: 53–64.
87. Baltazar G.A., Betler M.P., Akella K., Khatri R., Asaro R., Chendrasekhar A. Effect of osteopathic manipulative treatment on incidence of postoperative ileus and hospital length of stay in general surgical patients. J. Amer. Osteopath. Ass. 2013; 113 (3): 204–209.
88. Глушков А.А., Салахов Р.Г., Юнусова А.Д., Лебедев Д.С. Возможности применения остеопатической коррекции в реабилитации пациентов после стернотомий, выполненных в связи с хирургическим лечением приобретенных пороков сердца. Российский остеопатический журнал. 2020; 1–2: 122–130.
89. Zanolotti E., Berardinelli P., Bizzarri C., Civardi A., Manstretta A., Rossetti S., Fracchia C. Osteopathic manipulative treatment effectiveness in severe chronic obstructive pulmonary disease: A pilot study. Complement. Ther. Med. 2011; 20 (1–2): 16–22.
90. Yang M., Yuping Y., Yin X., Wang B.Y., Wu T., Liu G.J., Dong B.R., Dong Bi Rong, ed. Chest physiotherapy for pneumonia in adults. Cochrane Database System. Rev. 2013; 2 (2): CD006338.
91. Yao S., Hassani J., Gagne M., George G., Gilliar W. Osteopathic Manipulative Treatment as a Useful Adjunctive Tool for Pneumonia. J. Vis. Exp. 2014; 87: 50687. Published online 2014 May 6.
92. Noll D.R., Degenhardt B.F., Johnson J.C. Multicenter Osteopathic Pneumonia Study in the Elderly: Subgroup Analysis on Hospital Length of Stay, Ventilator-Dependent Respiratory Failure Rate, and In-hospital Mortality Rate. J. Amer. Osteopath. Ass. 2016; 116 (9): 574–587.
93. Белаш В.О., Хайбулина Г.А. Оценка клинической эффективности остеопатической коррекции у детей с хроническим бронхитом в условиях санатория. Российский остеопатический журнал. 2021; 3: 41–53.
94. Беляев А.Ф., Харьковская Т.С., Фотина О.Н., Юрченко А.А. Влияние остеопатической коррекции на функцию внешнего дыхания у пациентов, перенесших коронавирусную пневмонию COVID-19. Российский остеопатический журнал. 2021; 4: 8–17.

95. Беляев А. Ф., Фотина О. Н., Харьковская Т. С., Юрченко А. А. Эффективность реабилитации пациентов после перенесенной ковид-пневмонии методами остеопатии. Российский остеопатический журнал. 2022; 1: 14–22.
96. Мишина С. В., Четверикова Н. А. Стабилизация абдоминального кровотока остеопатическими техниками у пациентов, перенесших плевропневмонию. Российский остеопатический журнал. 2012; 3–4: 32–37.
97. Боброва Е. А., Аптекарь И. А., Абрамова Е. В. Остеопатическая коррекция миопии слабой степени у детей 7–10 лет. Российский остеопатический журнал. 2015; 1–2: 43–49.
98. Новосельцев С. В., Иванов В. К., Панасейко А. В., Мерзляков Е. Л., Ставрова Г. В. Остеопатическое лечение детей 7–12 лет, страдающих миопией со спазмом аккомодации. Российский остеопатический журнал. 2013; 3–4: 36–46.
99. Ведяшкина А. С., Милутка Ю. А., Ломакина Я. Н., Потехина Ю. П. Результаты остеопатической коррекции при миопии и спазме аккомодации у детей: систематический обзор с применением метаанализа. Российский остеопатический журнал. 2021; 1: 109–124.
100. Бахтиярова Г. З., Стенькова О. В. Возможности остеопатического лечения детей раннего возраста с патологией рефракции. Российский остеопатический журнал. 2018; 3–4: 78–86.
101. Симакова Е. Н., Стенькова О. В. Клиническая эффективность остеопатической коррекции в комплексном лечении больных с неоперированной открытоугольной глаукомой. Российский остеопатический журнал. 2019; 3–4: 97–105.
102. Зубков О. В., Смирнова Е. А., Крамар В. В., Курбатов О. И. Исследование эффективности остеопатической коррекции в комплексном лечении больных с прооперированной первичной открытоугольной глаукомой. Российский остеопатический журнал. 2021; 3: 66–76.
103. Mills M. V., Henley C. E., Barnes L. L., Carreiro J. E., Degenhardt B. F. The use of osteopathic manipulative treatment as adjuvant therapy in children with recurrent acute otitis media. Arch. Pediat. Adolesc. Med. 2003; 157 (9): 861–866.
104. Чайко Е. В., Курбатов О. И. Возможности остеопатической коррекции соматических дисфункций у детей с хроническим аденоидитом. Российский остеопатический журнал. 2019; 3–4: 62–71.
105. Accorsi A., Lucci C., Di Mattia L., Granchelli C., Barlafante G., Fini F., Pizzolorusso G., Cerritelli F., Pincherle M. Effect of Osteopathic Manipulative Therapy in the Attentive Performance of Children with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. J. Amer. Osteopat. Ass. 2014; 114: 374–381.
106. Белаш В. О., Байер Д. В., Костоусов В. В. Сочетанное применение остеопатической коррекции и транскраниальной микрополяризации головного мозга в лечении детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью. Российский остеопатический журнал. 2021; 4: 50–62.
107. Кудряшова В. Г., Четверикова Н. А. Исследование сочетанного применения остеопатической коррекции и ЭЭГ-БОС-тренингов у детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности. Российский остеопатический журнал. 2022; 1: 60–68.
108. Мусина Г. М., Кушков А. А., Мухин К. Ю. Влияние остеопатического лечения на уровни тревоги и депрессии по шкале HADS у детей с различными формами эпилепсий. Российский остеопатический журнал. 2018; 3–4: 87–97.
109. Терехова Е. Н., Мохов Д. Е. Эффективность остеопатического лечения пациентов с люмбалгией, сопровождающейся психосоматическими расстройствами. Российский остеопатический журнал. 2012; 3–4: 65–73.
110. Ерёмускин М. А., Мохов Д. Е., Белаш В. О. Динамика нейропсихологических показателей у пациентов с синдромом позвоночной артерии на фоне остеопатического лечения. Российский остеопатический журнал. 2016; 1–2: 29–35.
111. Дудин А. В., Туева И. Д., Белаш В. О. Оценка эффективности остеопатических методов коррекции в комплексной терапии псевдобульбарной дизартрии у детей дошкольного возраста. Российский остеопатический журнал. 2017; 1–2: 53–60.
112. Потехина Ю. П., Тиманин Е. М., Кантинов А. Е. Вязкоупругие характеристики тканей и их изменения после остеопатической коррекции. Российский остеопатический журнал. 2018; 1–2: 38–45.
113. Тиманин Е. М., Потехина Ю. П., Мохов Д. Е. Исследование вязкоупругих характеристик мышц шеи и верхней части грудной клетки методом вибрационной вискоэластографии. Мед. техника. 2019; 5 (317): 25–28.
114. Szlezak A. M., Georgiopoulou P., Bullock-Saxton J. E., Steele M. C. The immediate effect of unilateral lumbar Z-joint mobilisation on posterior chain neurodynamics: a randomised controlled study. Manual Ther. 2011; 16 (6): 609–613.
115. Samukawa M., Hattori M., Sugama N., Takeda N. The effects of dynamic stretching on plantar flexor muscle-tendon tissue properties. Manual Ther. 2011; 16 (6): 618–622.
116. Sefton J. M., Yazar-Fisher C., Carpenter D. M., Berry J. Physiological and clinical changes after therapeutic massage of the neck and shoulders. Manual Ther. 2011; 16 (5): 487–494.
117. Рыльский А. В., Мохов Д. Е. Остеопатическое лечение больных с дорсопатией в остром периоде. Российский остеопатический журнал. 2012; 3–4: 45–52.
118. Pohl H. Changes in the structure of collagen distribution in the skin caused by a manual technique. J. Bodyw. Mov. Ther. 2010; 14 (1): 27–34.
119. Martin M. M. Effects of myofascial release in diffuse systemic sclerosis. J. Bodyw. Mov. Ther. 2009; 13 (4): 320–327.
120. Bordoni B., Zanier E. Understanding Fibroblasts in Order to Comprehend the Osteopathic Treatment of the Fascia. Evid. Based Complement Alternat. Med. 2015; 2015: 860934.

121. Licciardone J. C., Kearns C. M., Hodge L. M., Bergamini M. V. Associations of cytokine concentrations with key osteopathic lesions and clinical outcomes in patients with nonspecific chronic low back pain: results from the Osteopathic Trial. *J. Amer. Osteopath. Ass.* 2012; 112 (9): 596–605.
122. Teodorczyk-Injeyan J. A., Injeyan H. S., Ruegg R. Spinal manipulative therapy reduces inflammatory cytokines but not substance P production in normal subjects. *J. Manipulat. Physiol. Ther.* 2006; 29 (1): 14–21.
123. Schander A., Downey H. F., Hodge L. M. Lymphatic pump manipulation mobilizes inflammatory mediators into lymphatic circulation. *Exp. Biol. Med* (Maywood). 2012; 237: 58–63.
124. Walkowski S., Singh M., Puertas J., Pate M., Goodrum K., Benencia F. Osteopathic manipulative therapy induces early plasma cytokine release and mobilization of a population of blood dendritic cells. *PLoS One.* 2014; 9 (3): 1–12.
125. Ruffini N., D'Alessandro G., Mariani N., Pollastrelli A., Cardinali L., Cerritelli F. Variations of high frequency parameter of heart rate variability following osteopathic manipulative treatment in healthy subjects compared to control group and sham therapy: randomized controlled trial. *Front Neurosci.* 2015; 9: 260–265.
126. D'Alessandro G., Cerritelli F., Cortelli P. Sensitization and interoception as key neurological concepts in osteopathy and other manual medicines. *Front Neurosci.* 2016; 10: 100–107.
127. Giles P. D., Hensel K. L., Pacchia C. F., Smith M. L. Suboccipital decompression enhances heart rate variability indices of cardiac control in healthy subjects. *J. Altern. Complement Med.* 2013; 19: 92–96.
128. Кальюранд М. Т., Логинова Е. В., Потехина Ю. П. Динамика функционального состояния организма у детей с задержкой психического развития под влиянием остеопатического лечения (по спектральным показателям вариабельности сердечного ритма). *Российский остеопатический журнал.* 2016; 3–4: 69–76.
129. Lund I., Ge Y., Yu L. C., Uvnas-Moberg K., Wang J., Yu C. C., Kurosawa M., Agren G., Rosen A., Lekman M., Lundeberg T. Repeated massage-like stimulation induces longterm effects on nociception: contribution of oxytocinergic mechanisms. *Europ. J. Neurosci.* 2002; 16 (2): 330–338.
130. Degenhardt B. F., Darmani N. A., Johnson J. C., Towns L. C., Rhodes D. C., Trinh C., McClanahan B., DiMarzo V. Role of osteopathic manipulative treatment in altering pain biomarkers: a pilot study. *J. Amer. Osteopath. Ass.* 2007; 107: 387–400.
131. McPartland J. M., Giuffrida A., King J., Skinner E., Scotter J., Musty R. E. Cannabimimetic effects of osteopathic manipulative treatment. *J. Amer. Osteopath. Ass.* 2005; 105: 283–291.
132. Вчерашний Д. Б., Ерофеев Н. П., Мохов Д. Е., Новосельцев С. В., Труфанов А. Н., Васильев М. Ю. Влияние остеопатических техник на венозную гемодинамику человека. *Мануал. тер.* 2009; 2 (34): 52–59.
133. Ерофеев Н. П., Мохов Д. Е., Новосельцев С. В., Вчерашний Д. Б. Остеопатическая коррекция венозного возврата. *Мануал. тер.* 2010; 4 (40): 22–32.
134. Мохов Д. Е., Черныга С. А. Исследование влияния остеопатической техники дренажа венозных синусов на венозный отток из полости черепа. *Российский остеопатический журнал.* 2014; 3–4: 58–65.
135. Белаш В. О., Мохов Д. Е., Трегубова Е. С. Остеопатическая коррекция в комплексной терапии и реабилитации пациентов с синдромом позвоночной артерии. *Вопр. курортол., физиотер. и ЛФК.* 2018; 95 (6): 34–43.
136. Лютина Т. И., Кузнецова Е. Л. Эффективность остеопатического лечения гипертонии-гидроцефального синдрома у детей раннего возраста. *Российский остеопатический журнал.* 2015; 1–2: 7–14.
137. Salamon E., Zhu W., Stefano G. B. Nitric oxide as a possible mechanism for understanding the therapeutic effects of osteopathic manipulative medicine (Review). *Int. J. Molec. Med.* 2004; 14 (3): 443–449.
138. Degenhardt B. F., Kuchera M. L. Update on osteopathic medical concepts and the lymphatic system. *J. Amer. Osteopath. Ass.* 1996; 96 (2): 97–100.
139. Dery M. A., Yonuschot G., Winterson B. The effects of manually applied intermittent pulsation pressure to rat ventral thorax on lymph transport. *J. Lymphology.* 2000; 33 (2): 58–61.
140. Schander A., Padro D., King H. H., Downey H. F., Hodge L. M. Lymphatic pump treatment repeatedly enhances the lymphatic and immune systems. *Lymphat. Res. Biol.* 2013; 11: 219–226.
141. Степанцова С. А., Мизонова И. Б., Новосельцев С. В., Вчерашний Д. Б., Мохов Д. Е. Остеопатическая коррекция объема внеклеточной жидкости тела человека. *Мануал. тер.* 2014; 1 (53): 26–31.
142. Тиманин Е. М., Сиднева Н. С., Захарова А. А. Влияние остеопатической коррекции на вязкоупругие характеристики мышц голени. *Российский остеопатический журнал.* 2019; 1–2: 93–98.

Приложение А1

Состав рабочей группы по разработке и пересмотру клинических рекомендаций

Мохов Дмитрий Евгеньевич — доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, директор Института остеопатии и интегративной медицины, заведующий кафедрой остеопатии ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова» Минздрава России, директор Института остеопатии медицинского факультета ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет», врач-osteopat

Белаш Владимир Олегович — кандидат медицинских наук, доцент, доцент кафедры остеопатии ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» Минздрава России, врач-osteopat, врач-невролог, врач ультразвуковой диагностики

Аптекарь Игорь Александрович — кандидат медицинских наук, директор АНО «Тюменский институт мануальной медицины», НОУ ДПО «Тюменский институт остеопатической медицины», врач-osteopat, мануальный терапевт

Ненашкина Эльвира Николаевна — ассистент Института остеопатии медицинского факультета ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет», врач-osteopat, врач акушер-гинеколог

Потехина Юлия Павловна — доктор медицинских наук, профессор, профессор кафедры нормальной физиологии им. Н.Ю. Беленкова ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава России, заместитель директора по научно-методической работе ЧОУ ДПО «Институт остеопатии»

Трегубова Елена Сергеевна — доктор медицинских наук, профессор кафедры остеопатии ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» Минздрава России, заместитель директора Института остеопатии медицинского факультета ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет»

Беляев Анатолий Федорович — доктор медицинских наук, профессор, профессор Института клинической неврологии и реабилитационной медицины ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный медицинский университет» Минздрава России, директор Приморского краевого общественного учреждения «Институт вертеброневрологии и мануальной медицины», заслуженный врач Российской Федерации, врач-osteopat, мануальный терапевт, врач-невролог

Авторы подтверждают отсутствие финансовой поддержки/конфликта интересов, который необходимо обнародовать.

Приложение А2

Методология разработки клинических рекомендаций

Целевая аудитория данных клинических рекомендаций:

- 1) врачи-osteopatы;
 - 2) студенты медицинских вузов, обучающиеся по специальности «Остеопатия» (специалитет);
 - 3) врачи, обучающиеся по программам дополнительного профессионального образования по остеопатии;
 - 4) обучающиеся в ординатуре по специальности «Остеопатия».
1. Шкала оценки уровней достоверности доказательств (УДД) для методов диагностики (диагностических вмешательств)

УДД	Расшифровка
1	Систематические обзоры исследований с контролем референсным методом или систематический обзор рандомизированных клинических исследований с применением метаанализа
2	Отдельные исследования с контролем референсным методом или отдельные рандомизированные клинические исследования и систематические обзоры исследований любого дизайна, за исключением рандомизированных клинических исследований, с применением метаанализа
3	Исследования без последовательного контроля референсным методом или исследования с референсным методом, не являющимся независимым от исследуемого метода, или нерандомизированные сравнительные исследования, в том числе когортные исследования
4	Несравнительные исследования, описание клинического случая
5	Имеется лишь обоснование механизма действия или мнение экспертов

2. Шкала оценки уровней достоверности доказательств (УДД) для методов профилактики, лечения и реабилитации (профилактических, лечебных, реабилитационных вмешательств)

УДД	Расшифровка
1	Систематический обзор рандомизированных клинических исследований с применением метаанализа
2	Отдельные рандомизированные клинические исследования и систематические обзоры исследований любого дизайна, за исключением рандомизированных клинических исследований, с применением метаанализа
3	Нерандомизированные сравнительные исследования, в том числе когортные исследования
4	Несравнительные исследования, описание клинического случая или серии случаев, исследование «случай-контроль»
5	Имеется лишь обоснование механизма действия вмешательства (доклинические исследования) или мнение экспертов

3. Шкала оценки уровней убедительности рекомендаций (УУР) для методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации (профилактических, диагностических, лечебных, реабилитационных вмешательств)

УУР	Расшифровка
A	Сильная рекомендация [все рассматриваемые критерии эффективности (исходы) являются важными, все исследования имеют высокое или удовлетворительное методологическое качество, их выводы по интересующим исходам являются согласованными]
B	Условная рекомендация [не все рассматриваемые критерии эффективности (исходы) являются важными, не все исследования имеют высокое или удовлетворительное методологическое качество и/или их выводы по интересующим исходам не являются согласованными]
C	Слабая рекомендация, отсутствие доказательств надлежащего качества [все рассматриваемые критерии эффективности (исходы) являются неважными, все исследования имеют низкое методологическое качество и их выводы по интересующим исходам не являются согласованными]

Актуализация данных клинических рекомендаций будет проводиться не реже одного раза в 3 года.

Решение об обновлении будет принято на основании предложений, представленных медицинскими профессиональными некоммерческими организациями с учётом результатов комплексной оценки лекарственных препаратов, медицинских изделий, а также результатов клинической апробации, при появлении новых данных с позиции доказательной медицины.

Приложение А3

Справочные материалы, включая соответствие показаний к применению и противопоказаний, способов применения и доз лекарственных препаратов, инструкции по применению лекарственного препарата

Приложение А3.1

Организация медицинской помощи населению по профилю «Остеопатия»

Государственное регулирование остеопатии началось в 2012 г. и к настоящему времени охватывает практически все основные аспекты оказания населению РФ медицинской помощи по профилю «Остеопатия». Врач-osteopat в своей работе руководствуется перечисленными ниже постановлениями правительства РФ и приказами органов исполнительной власти.

1. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.12.2012 № 1183н «Об утверждении Номенклатуры должностей медицинских работников и фармацевтических работников».
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.09.2013 № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования».
3. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.05.2014 № 236 «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 октября 2012 г. № 444 „О главных внештатных специалистах Министерства здравоохранения Российской Федерации“».
4. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.12.2014 № 959 «О списке главных внештатных специалистов Министерства здравоохранения Российской Федерации в федеральных округах Российской Федерации».
5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24.07.2015 № 481н «Об утверждении примерных дополнительных профессиональных программ медицинского образования по специальности „Остеопатия“».
6. Приказ Министерства Здравоохранения Российской Федерации от 28.09.2018 № 655н «Об утверждении примерной дополнительной профессиональной программы по специальности „Остеопатия“».
7. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 07.10.2015 № 700н «О номенклатуре специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское и фармацевтическое образование».
8. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08.10.2015 № 707н «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки „Здравоохранение и медицинские науки“».
9. Постановление Правительства Российской Федерации от 08.12.2016 № 1327 «О внесении изменений в приложение к Положению о лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 2.5. Организация медицинской помощи населению по профилю „Остеопатия“ организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра „Сколково“)».
10. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11.03.2016 № 157 «О федеральном методическом центре по остеопатии».
11. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 02.06.2016 № 334н «Об утверждении Положения об аккредитации специалистов».
12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.04.2017 № 320 «О внесении изменений в перечни специальностей и направлений подготовки высшего образования».
13. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13.06.2017 № 325н «О внесении изменений в Требования к организации и выполнению работ (услуг) при оказании первичной медико-санитарной, специализированной (в том числе высокотехнологичной), скорой (в том числе скорой специализированной), паллиативной медицинской помощи, оказании медицинской помощи при санаторно-курортном лечении, при проведении медицинских экспертиз, медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в рамках оказания медицинской помощи, при трансплантации (пересадке) органов и/или тканей, обращении донорской крови и/или ее компонентов в медицинских целях, утвержденные приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 марта 2013 г. № 121н».

14. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.06.2017 № 328н «О внесении изменений в Квалификационные требования к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки „Здравоохранение и медицинские науки“, утвержденные приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 октября 2015 г. № 707н».
15. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13.10.2017 № 804н «Об утверждении номенклатуры медицинских услуг».
16. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22.12.2017 № 1043 «Об утверждении сроков и этапов аккредитации специалистов, а также категорий лиц, имеющих медицинское, фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитации специалистов».
17. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.12.2018 № 898н «О внесении изменений в сроки и этапы аккредитации специалистов, а также категорий лиц, имеющих медицинское, фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитации специалистов, утвержденные приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22 декабря 2017 г. № 1043н».
18. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.01.2018 № 21н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю „Остеопатия“».
19. Приказ Минздрава России от 02.11.2020 № 1186н «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 декабря 2014 г. № 834н „Об утверждении унифицированных форм медицинской документации, используемых в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению“».
20. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 2 июня 2021 г. № 358н «Об утверждении профессионального стандарта „Врач-остеопат“».
21. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (Минобрнауки России) от 16 сентября 2020 г. № 1187 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования — специалитета по специальности 31.05.04 „Остеопатия“».

Право на занятие медицинской практикой по профилю «Остеопатия» (как в медицинских организациях разных форм собственности, так и частной практикой) имеют лица, соответствующие квалификационным требованиям к врачу-остеопату, профессиональному стандарту «Врач-остеопат».

Квалификационные требования к врачам-остеопатам сформулированы в приказе Министерства здравоохранения Российской Федерации № 707н, дополнения внесены приказом Минздрава России от 15.06.2017 № 328н., приказом Минздрава России от 04.09.2020 № 940н.

Согласно действующему законодательству в Российской Федерации, врачом-остеопатом может быть только специалист, имеющий высшее медицинское образование. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». подготовка врачей-специалистов осуществляется путем реализации образовательных программ высшего образования и дополнительных профессиональных образовательных программ (ст. 82, п. 1); ординатура является уровнем высшего образования. Подготовка врачей-остеопатов осуществляется в ординатуре и на длительных циклах профессиональной переподготовки, которые смогут проводить только лицензированные образовательные организации на основании примерных программ, утвержденных Министерством здравоохранения Российской Федерации (ст. 82, п. 3).

В 2017 г. Министерство образования и науки Российской Федерации утвердило введение специалитета по остеопатии в медицинских вузах, — остеопатия вошла в число базовых медицинских специальностей наряду с лечебным делом, педиатрией и стоматологией. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.04.2017 № 320 «О внесении изменений в пе-

речни специальностей и направлений подготовки высшего образования» был дополнен перечень специальностей высшего образования — специалитета по УГС «Здравоохранение и медицинские науки» направление 31.00.00 «Клиническая медицина» еще одной специальностью — 31.05.04 «Остеопатия». Приказом Минобрнауки от 16.09.2020 г. №1187 утвержден федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования — специалитет по специальности 31.05.04 «Остеопатия».

Таким образом, в Российской Федерации принята поливариантная модель подготовки врачей-osteопатов (в отличие от других медицинских специальностей, для которых основным способом получения необходимой квалификации является подготовка в ординатуре):

1) обучение по программе высшего образования (уровень специалитета) по специальности 32.05.04 «Остеопатия»;

2) обучение по программе высшего образования — подготовки кадров высшей квалификации (ординатура) по специальности 31.08.52 «Остеопатия»;

3) обучение по программе дополнительного профессионального образования — профессиональной переподготовки по специальности «Остеопатия» при наличии подготовки в ординатуре по одной из 56 специальностей согласно приказу МЗ РФ № 707н (с изменениями и дополнениями).

Независимо от формы получения образования врач-osteопат будет иметь право оказывать медицинскую помощь по профилю «Остеопатия».

Условием допуска к профессиональной деятельности является наличие сертификата по специальности «Остеопатия», а с 2020 г. обязательным является прохождение процедуры аккредитации (приказ МЗ РФ от 21.12.2018 № 898н «О внесении изменений в сроки и этапы аккредитации специалистов, а также категорий лиц, имеющих медицинское, фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитации специалистов, утвержденные приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22.12.2017 г. № 1043н»).

Врач-osteопат может оказывать медицинскую помощь населению по профилю «Остеопатия» в медицинских организациях и иных организациях, осуществляющих медицинскую деятельность, имеющих лицензию на медицинскую деятельность, включая работы (услуги) по остеопатии.

Медицинская помощь по профилю «Остеопатия» определяется как совокупность диагностических, лечебных, реабилитационных и профилактических мероприятий, проводимых пациентам с соматическими дисфункциями (обратимыми структурно-функциональными нарушениями соединительной ткани), которые могут как выступать в виде самостоятельной нозологической формы, так и сопровождать острые и хронические заболевания терапевтического, неврологического, педиатрического, стоматологического профиля (за исключением острой хирургической патологии), травматические повреждения.

Медицинская помощь по профилю «Остеопатия» оказывается в виде первичной медико-санитарной помощи, специализированной (за исключением высокотехнологичной) медицинской помощи и медицинской помощи при санаторно-курортном лечении в следующих условиях:

- амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения);
- в дневном стационаре (в условиях, предусматривающих медицинское наблюдение и лечение в дневное время, но не требующих круглосуточного наблюдения и лечения);
- стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение).

Формы медицинской помощи по профилю «Остеопатия»:

- плановая;
- неотложная.

Плановая помощь оказывается при проведении профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной

и неотложной медицинской помощи, и отсрочка оказания которой на определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью.

Неотложная помощь оказывается при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, без явных признаков угрозы жизни пациента, не требующих экстренной медицинской помощи.

Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается врачом-остеопатом по медицинским показаниям при самостоятельном обращении пациента либо по направлению врача-терапевта, врача-терапевта участкового, врача общей практики (семейного врача), врача-педиатра, врача-педиатра участкового, врача мануальной терапии, фельдшера. Для обеспечения принципа преемственности при направлении к врачу-остеопату пациенту предоставляется выписка из медицинской документации пациента, заверенная подписью лечащего врача и подписью руководителя (уполномоченного лица) направляющей медицинской организации, содержащая диагноз заболевания (состояния), код диагноза по Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10-го пересмотра (МКБ-10), сведения о состоянии здоровья пациента, проведенных диагностике и лечении и подтверждающая необходимость оказания медицинской помощи по профилю «Остеопатия». К выписке из медицинской документации пациента прилагаются результаты лабораторных, инструментальных и других видов исследований, подтверждающие установленный диагноз.

Если требуется дополнительное обследование пациента, врач-остеопат рекомендует его проведение (с указанием необходимого объема дополнительного обследования).

При невозможности оказания медицинской помощи в рамках первичной специализированной медико-санитарной помощи и при наличии медицинских показаний пациент направляется в медицинскую организацию, оказывающую специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях и в условиях дневного стационара.

При наличии медицинских показаний пациент направляется для проведения реабилитационных мероприятий в специализированные медицинские и санаторно-курортные организации.

Медицинская услуга по профилю «Остеопатия» может быть простой (неделимой) или комплексной (совокупность простых услуг, отражающих технологический процесс оказания остеопатической помощи при определенной соматической дисфункции), что нашло отражение в номенклатуре медицинских услуг, утвержденных приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13.10.2017 № 804н «Об утверждении номенклатуры медицинских услуг». Как правило, остеопатическая медицинская услуга является комплексом медицинских вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, а также медицинскую реабилитацию, и имеет самостоятельное законченное значение.

Система ведения медицинской документации в медицинских организациях должна обеспечивать прочную и логическую связь между:

- номенклатурой услуг и номенклатурой специалистов;
- правилами заполнения медицинских карт пациента и наименованиями услуг;
- документами о страховой ответственности за качество медицинской услуги и актами судебно-медицинских экспертиз;
- стандартами оказания медицинской помощи и договорами платных услуг;
- информированными согласиями и опять же номенклатурой услуг.

Индивидуальный персонифицированный подход к пациенту, отличающий оказание медицинской помощи по профилю «Остеопатия», не исключает выполнения единых диагностических алгоритмов и предполагает выбор тактики остеопатической коррекции, основанной на остеопатическом статусе пациента и выявленной доминирующей соматической дисфункции (osteopaticкое заключение в медицинской документации — бланке осмотра врача-osteopата).

Индивидуализация остеопатических услуг определяется не только остеопатическим статусом конкретного пациента, но и его возрастными и анатомо-физиологическими особенностями (новорожденные и дети первого года жизни, дети, лица преклонного возраста, беременные), физическим и эмоциональным состоянием врача-osteopata и пациента в момент получения услуги.

В ряде случаев индивидуальный подход к пациенту снижает предсказуемость результатов, но повышает качество остеопатической услуги.

Оценка результатов медицинских услуг по остеопатии не всегда однозначна. Остеопатическая диагностика позволяет выявить нарушение функционального состояния еще на этапе предболезни или на ее ранней, доклинической стадии. В ряде случаев это предполагает проведение дополнительных углубленных методов диагностики, в том числе лабораторной и инструментальной. В результате диагностических мероприятий могут быть выявлены различные заболевания, и их выявление не всегда будет пациентом оцениваться положительно. В то же время ранняя диагностика заболеваний позволяет провести терапию еще на доклинической стадии, что значительно повышает прогноз положительного исхода для пациента.

Доказанным фактом является феномен отсроченного терапевтического эффекта, который наблюдается в течение 72 ч после оказания остеопатической помощи. Терапевтический эффект после сеанса в 20–30 % случаев пациентами не расценивается как положительный. В то же время по истечении 72 ч после терапии механизмы самокоррекции и восстановления, запущенные во время остеопатического сеанса, значительно улучшают состояние пациента, вплоть до полного исчезновения клинической симптоматики.

Сотрудничество врача-osteopata и пациента в процессе оказания медицинских услуг по остеопатии значительно влияет на субъективную составляющую оценки качества самой услуги.

Таким образом, можно сказать, что специфическими особенностями медицинских услуг по профилю «Остеопатия» является:

- перцептивный «диалог с телом» и высокая эффективность пальпаторной диагностики;
- персонифицированность;
- целостность и комплексность;
- неосязаемость до момента получения;
- субъективность оценки результата;
- зависимость от взаимодействия с пациентом.

Оказание медицинской помощи по профилю «Остеопатия» — это сегмент общего рынка медицинских товаров и услуг, предоставляющий специализированные остеопатические услуги для восстановления, сохранения и улучшения здоровья граждан.

Приложение А3.2

Заболевания, при которых доказаны положительные результаты osteopатической коррекции

Несмотря на то, что остеопатия развивалась относительно обособленно от официальной медицины, накоплен достаточно большой объем доказательств ее эффективности и безопасности при широком круге заболеваний, в том числе при проведении контролируемых рандомизированных исследований как в России, так и за рубежом. В исследованиях результаты ОК сравнивают с результатами, полученными при использовании стандартного аллопатического лечения или при имитации ОК. Доказательства результатов ОК опираются на сравнение выраженности жалоб пациентов, оценки качества жизни, количества принимаемых лекарств, результатов психологических тестов, а также данных объективных методов обследования (гониометрия, УЗИ, стабилметрия и др.).

**Заболевания, при которых доказаны положительные результаты
остеопатической коррекции**

Заболевание	Результаты остеопатической коррекции (ОК)	Уровень доказательности	Библиографические ссылки
Болезни опорно-двигательного аппарата			
Дорсопатия Неспецифическая хроническая боль в пояснице	Более выраженное снижение боли после курса ОК по сравнению со стандартным лечением или плацебо. После курса ОК боль в пояснице значительно уменьшилась в краткосрочном (1 мес, $p=0,01$), среднесрочном (3 мес, $p<0,001$), и долгосрочном (1 год, $p=0,03$) периоде. Более быстрое восстановление функций спины ($p=0,003$), улучшение функций спины ($p=0,02$)	Метаанализ рандомизированных контролируемых исследований (РКИ) РКИ, в том числе с плацебо-контролем (имитация ОК)	[45–48]
Хроническая боль в пояснице во время беременности или после нее	После курса ОК интенсивность боли по ВАШ снизилась в среднем с 6 до 2 баллов ($p<0,001$), в контрольной группе изменений не было	РКИ (по сравнению с отсутствием лечения)	[49]
Хроническая неспецифическая боль в шее	В группе ОК значительное уменьшение интенсивности боли на 8-й неделе ($p=0,001$) и на 20-й неделе ($p=0,003$). Клинически значимое уменьшение интенсивности боли на 20-й неделе было у 78% пациентов в группе ОК и у 48% пациентов в группе сравнения. В течение 8 нед лечения в группе ОК средний прием анальгетиков составил $0,1\pm0,1$ суточной дозы и $0,5\pm0,3$ суточной дозы в группе имитации ОК	РКИ с плацебо-контролем (имитация ОК)	[50]
Острая боль в шее	Оценивали интенсивность боли по ВАШ непосредственно перед лечением и через 1 ч после лечения. В обеих группах наблюдали значительное снижение интенсивности болевого синдрома. Пациенты, получавшие ОК, сообщили о значительно более заметном снижении интенсивности боли ($p=0,02$)	РКИ (сравнение однократной дозы кеторолака внутримышечно и сеанса ОК)	[51]
Дисфункции височно-нижнечелюстного сустава (ДВНЧС)	Значительное различие ($p<0,0001$) и большее влияние ОК на активное открытие рта и на боль при активном открытии рта по сравнению с другими консервативными методами лечения ДВНЧС	Метаанализ РКИ	[52]
Постинсультная периартропатия плечевого сустава («замороженное плечо»)	Независимо от метода лечения, интенсивность болевого синдрома после курса лечения снижалась у всех пациентов ($p<0,05$). У пациентов в контрольной группе через полгода интенсивность боли практически вернулась к исходной. В группе ОК показатели по опроснику ВАШ через полгода после лечения остались ниже исходного уровня. У всех пациентов произошло статистически значимое увеличение повседневной активности и возможности действия пораженной рукой по показателям простого теста плеча ($p<0,05$). При этом в группе ОК показатели статистически значимо более высокие ($p<0,001$)	РКИ (ОК на фоне стандартного лечения по сравнению со стандартным лечением)	[53]
Восстановление после травмы верхних конечностей — перелом лучевой кости	Показатели, характеризующие объем движений в лучезапястном суставе, в опытной группе были значительно выше, чем в контрольной ($p<0,001$)	РКИ (ОК по сравнению со стандартным курсом реабилитации)	[54]

Продолжение

Заболевание	Результаты остеопатической коррекции (ОК)	Уровень доказательности	Библиографические ссылки
Восстановление после травмы верхних конечностей — перелом большого бугорка плечевой кости	В группе ОК после лечения отмечены более низкие показатели болевого синдрома ($p=0,04$). Изменение объема движений у пациентов группы ОК после лечения было более выраженным, чем у пациентов контрольной группы: в 1,3 раза больше для сгибания, в 1,4 раза — для отведения и в 1,6 раза — для наружной ротации ($p=0,00001$). Средний срок восстановления функции плечевого сустава по шкале OSS в группе ОК составил $19,8 \pm 2,7$ дня, в контрольной — $27,5 \pm 0,3$ дня ($p=0,000001$)	РКИ (ОК на фоне стандартного курса реабилитации по сравнению со стандартным курсом реабилитации)	[55]
Посттравматическая кокцигодия	После лечения в группе ОК интенсивность болевого синдрома снизилась в 4,6 раза, составив $1,3 \pm 0,26$ балла ($p<0,001$), а через 3 мес произошло лишь незначительное ее увеличение до $2,2 \pm 0,72$ балла ($p<0,001$). В контрольной группе интенсивность болевого синдрома снизилась почти в 2 раза до $3,0 \pm 0,83$ балла ($p<0,05$), однако через 3 мес возросла до $4,9 \pm 0,91$ балла, приблизившись к исходным значениям ($p>0,05$). Показатели физического и психологического компонентов здоровья по опроснику SF-36 в группе ОК превышали таковые в контрольной группе ($p<0,001$)	РКИ (ОК по сравнению с мануальной терапией)	[56]
Травмы голеностопного сустава — повреждение капсульно-связочного аппарата	Показатели, характеризующие объем движений в голеностопном суставе, в группе ОК были выше, чем в контрольной, в 1,5–1,8 раза ($p<0,05$). В обеих группах имела тенденция к снижению интенсивности болевого синдрома по ВАШ и, соответственно, к повышению качества жизни, более выраженная в группе ОК ($p<0,05$)	РКИ (ОК на фоне стандартного лечения по сравнению со стандартным лечением)	[57]
Мышечная кривошея у детей вследствие родовой травмы	В группе ОК по сравнению с контрольной группой было отмечено более полное устранение биомеханических и тонусных нарушений в шее ($p<0,05$), более быстрое уменьшение болевого синдрома, измеренного по шкале FLACC ($p<0,05$), и уменьшение коэффициента асимметрии при сонографическом исследовании ($p<0,05$)	РКИ (ОК по сравнению с обычным лечением)	[58, 59]
Дисплазия и подвывих тазобедренного сустава (ТБС) у детей	Дети первого года жизни с дисплазией и подвывихом ТБС получали ОК в промежутках между сменами абдукционных шин-распорок. ОК приводила к улучшению соотношений костных элементов тазобедренного сустава по данным УЗИ, значительно уменьшала сроки их формирования, давало возможность формировать сустав без назначения лекарственных препаратов. Уменьшение сроков фиксации ребенка в отводящих шинах в среднем на 1 мес ($p<0,05$) благоприятно влияет на психоэмоциональное состояние матери и ребенка, а также дает ребенку возможность не отставать в физическом развитии от сверстников. Получено более выраженное снижение ацетабулярного индекса при рентгенологическом обследовании в группе ОК на фоне ортопедического лечения по сравнению со стандартной программой ($p<0,05$)	РКИ (ОК на фоне стандартного лечения по сравнению со стандартным лечением)	[60–63]
Идиопатический сколиоз I степени у детей	Уменьшение величины угла Кобба в группе ОК (с $7,3 \pm 0,8$ до $4,2 \pm 0,8$ градуса; $M \pm m$, $p<0,05$) и увеличение данного показателя в группе сравнения (с $7,0 \pm 0,7$ до $9,1 \pm 1,4$ градуса; $M \pm m$, $p<0,05$)	РКИ (ОК по сравнению со стандартным лечением)	[64]

Продолжение

Заболевание	Результаты остеопатической коррекции (ОК)	Уровень доказательности	Библиографические ссылки
Плоскостопие у детей	ОК привела к уменьшению числа жалоб (общая утомляемость при длительной ходьбе, боли в ногах и спине, спазм икроножных мышц, нарушение походки) в 13,5 раза, а в контрольной группе (стандартное лечение) — в 1,4 раза ($p<0,05$). В группе ОК индекс Чижина вернулся к норме и состояние стоп оценили как нормальное ($p<0,01$), в то время как у детей контрольной группы индекс Чижина не позволял оценить стопу как нормальную	РКИ (ОК на фоне стандартного лечения по сравнению со стандартным лечением)	[65]
Недифференцированная дисплазия соединительной ткани у детей и подростков	В группе ОК наблюдали снижение интенсивности болевого синдрома ($p<0,05$), нормализацию функционирования вегетативной нервной системы (достижение состояния вегетативного равновесия, оцениваемого по индексу Кердо), снижение уровня депрессии и тревожности ($p<0,05$) в большей степени, чем в контрольной группе ($p<0,05$)	РКИ (ОК по сравнению с обычным лечением)	[66]
Болезни нервной системы			
Мигрень	ОК значительно снижает количество баллов HIT-6 (влияние головной боли на повседневную активность) (ОК—обычное лечение, $p<0,001$, ОК—имитация ОК, $p<0,001$), потребление анальгетиков, дней мигрени (ОК—обычное лечение, $p<0,001$, ОК—имитация ОК, $p<0,001$), интенсивности боли и функциональной инвалидности ($p<0,001$)	РКИ (ОК по сравнению с обычным лечением и с имитацией ОК)	[67]
Головная боль напряжения	В группе ОК отмечено значительное уменьшение частоты приступов головной боли ($p<0,05$), имитация ОК не произвела статистически значимых изменений. Значительно снизилось использование лекарств в группе ОК ($p<0,05$). В группе ОК уменьшение степени выраженности болевого синдрома ($p=0,01$) и астенического состояния ($p<0,05$). У пациентов контрольной группы достоверных изменений данных показателей получено не было	РКИ (ОК по сравнению с плацебо — имитацией ОК) РКИ (ОК вместе со стандартным лечением по сравнению со стандартным лечением)	[68, 69]
Туннельная компрессионно-ишемическая невропатия — синдром запястного канала	Число пациентов с гипестезией в зоне иннервации срединного нерва на кисти в группе ОК статистически значимо снизилось с 60 до 33,3% ($p<0,05$), в контрольной группе $p>0,05$. ОК показывает большую эффективность при оценке субъективных жалоб пациентов и показателей ЭНМГ ($p<0,05$)	РКИ (ОК по сравнению с физиотерапией)	[70]
Перинатальные поражения ЦНС гипоксически-ишемического генеза I–II степени	В группе детей до 1 года, получавших ОК, отмечалась существенная положительная динамика в виде уменьшения мышечного дисбаланса, увеличения объема активных и пассивных движений, исчезновения патологических рефлексов и признаков задержки психомоторного развития, восстановления выпрямительных реакций, становления координации движений, улучшения силы и манипулятивных функций кисти ($p<0,05$). В контрольной группе была также отмечена положительная динамика, однако менее значимая по сравнению с основной группой. У 64 % детей в основной и 28 % детей в контрольной группе двигательные нарушения после проведенного лечения исчезли	РКИ (ОК вместе со стандартным лечением по сравнению со стандартным лечением)	[71, 72]

Продолжение

Заболевание	Результаты остеопатической коррекции (ОК)	Уровень доказательности	Библиографические ссылки
Гипертензионно-гидроцефальный синдром (ГГС) у детей до 1 года	Пациентов с полным регрессом неврологической симптоматики не было ни в одной группе. В группе ОК наблюдалась более выраженная положительная динамика в проявлениях общей мозговой симптоматики, в уменьшении ширины боковых желудочков по данным нейросонографии, в уменьшении асимметрии линейной скорости кровотока по позвоночным артериям по данным УЗДГ ($p < 0,05$)	РКИ (ОК вместе со стандартным лечением по сравнению со стандартным лечением)	[73]
Бульбарная дизартрия легкой формы у детей до 1 года	В группе ОК в 75 % случаев восстановился тонус языка, в 85 % случаев — нормальная подвижность и тонус круговой мышцы рта, в 80 % случаев исчезала или уменьшалась асимметрия линейной скорости кровотока в вертебробазилярном бассейне по данным УЗДГ. В группе сравнения эти показатели остались без изменения или ухудшились. ОК позволяет эффективно устранить причины дизартрических проявлений, что существенно ускоряет процесс восстановления речевых функций, а также предотвращает прогрессирование задержки предречевого развития при интранатальном повреждении краниовертебрального перехода	РКИ (ОК по сравнению со стандартным лечением)	[74]
Детский церебральный паралич (ДЦП)	После курса ОК на фоне общепринятого лечения улучшаются двигательные функции [по Gross Motor Function Measurement (GMFM-88)] на 9,8 % ($p < 0,05$) и показатель функциональной независимости у детей [по Functional Independence Measure for Children (WeeFIM)], $p < 0,05$. Улучшение GMFM, обнаруженное в группе ОК, выгодно отличается от результатов других исследований с использованием различных вмешательств, некоторые из которых были инвазивными (например, селективная дорсальная ризотомия)	Когортное исследование	[75]
Задержка речевого развития у детей	В группе ОК отмечено достоверное снижение степени выраженности речевых нарушений по сравнению с пациентами контрольной группы ($p < 0,00001$)	РКИ (ОК вместе со стандартным лечением по сравнению со стандартным лечением)	[76]
Болезни пищеварительной системы			
Синдром раздраженного кишечника (СРК)	ОК уменьшает метеоризм и боль в краткосрочном и долгосрочном периодах (1 год), $p < 0,05$, и также уменьшает ректальную чувствительность, выражающиеся в увеличении порогового объема и максимально допустимого объема ($p < 0,001$)	РКИ (ОК по сравнению с плацебо — имитацией ОК)	[77]
	ОК способствует уменьшению выраженности симптомов СРК — боль в абдоминальной области, запор, диарея — по сравнению с теми, кто получал имитацию или стандартное лечение ($p < 0,05$)	Обзор РКИ	[78]
	После проведения 2–3 сеансов ОК в сочетании с обычной терапией отмечается восстановление тонуса, ритмичности и амплитуды сокращений практически во всех отделах ЖКТ в отличие от пациентов контрольной группы, получавших только стандартное лечение ($p < 0,05$), по данным электрогастроэнтерографии (ЭГЭГ)	РКИ (ОК вместе со стандартным лечением по сравнению со стандартным лечением)	[79]

Продолжение

Заболевание	Результаты остеопатической коррекции (ОК)	Уровень доказательности	Библиографические ссылки
Хронический запор	После проведенного курса ОК отмечено значительное уменьшение выраженности запоров ($p < 0,01$), общее улучшение симптомов ($p < 0,01$), уменьшение времени транзита по толстой кишке ($p < 0,01$) и улучшение общего качества жизни ($p < 0,01$)	Когортное исследование	[80]
Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ)	В обеих группах статистически значимо снизилась выраженность клинических симптомов по опроснику GerdQ. При этом в основной группе снижение было статистически значимо более выраженным, чем в контрольной группе ($p < 0,05$)	РКИ (ОК вместе со стандартным лечением по сравнению со стандартным лечением)	[81]
Хронический гастрит	Уменьшение отека и гиперемии слизистой оболочки желудка в контрольной и основной группах ($p < 0,05$). У пациентов группы ОК отмечено снижение кислотности желудочного сока по сравнению с контрольной группой ($p < 0,001$)	РКИ (ОК вместе со стандартным лечением по сравнению со стандартным лечением)	[82]
Болезни мочевыводящих путей			
Недержание мочи у женщин	Достигнуто статистически и клинически значимое улучшение, когда сравнивали группу, получавшую ОК, с нелеченной группой ($p = 0,001$). Сравнение результатов ОК с тренировкой мышц тазового дна показало практически одинаковый терапевтический эффект ($p = 0,94$)	Обзор РКИ	[83]
Нейрогенные дисфункции мочевого пузыря, осложнённые хроническим буллезным циститом и пузырно-мочеточниковым рефлюксом (ПМР) у детей	После проведённой комплексной терапии с включением ОК полностью исчезли симптомы, резко снижающие качество жизни: полное отсутствие позыва к микции (отведение мочи катетером), подтекание мочи и стрессовое недержание. По данным УЗИ, в основной группе уменьшился объём мочевого пузыря ($p < 0,01$), толщина стенки ($p < 0,01$) и объём остаточной мочи ($p < 0,01$) по сравнению с контрольной группой. Включение ОК в комплексное лечение может быть рекомендовано также с целью уменьшения фармакологической нагрузки и уменьшения оперативной активности при лечении ПМР	РКИ (ОК вместе со стандартным лечением по сравнению со стандартным лечением)	[84]
Хронический пиелонефрит у беременных	В группе ОК отмечено уменьшение степени выраженности болевого синдрома ($p = 0,001$), улучшение показателей психоэмоционального состояния в категории «активность» ($p = 0,05$) по опроснику SAN и повышение показателей физического и психологического компонентов качества жизни, $p = 0,02$ (опросник Medical Outcomes Study — Short Form)	РКИ (ОК вместе со стандартным лечением по сравнению со стандартным лечением)	[85]
Реабилитация после оперативных вмешательств			
Пострадиационно-мастэктомический синдром	При рано начатой ОК (с первых недель после операции) отмечается улучшение функции верхней конечности ($p < 0,01$): сгибание и отведение верхней конечности через 3 и 6 мес восстанавливаются в большем объеме, чем у пациентов в контрольной группе. Данные дуплексного сканирования свидетельствуют об улучшении показателей гемодинамики ($p < 0,05$) и, соответственно, уменьшается степень отека верхней конечности ($p < 0,05$)	КИ (ОК вместе со стандартным лечением по сравнению со стандартным лечением)	[86]

Продолжение

Заболевание	Результаты остеопатической коррекции (ОК)	Уровень доказательности	Библиографические ссылки
Послеоперационная кишечная непроходимость	После ОК, используемой после серьезной полостной операции, требуется меньше времени для выведения газов и пациенты меньше времени проводят в больнице после операции. Средняя продолжительность послеоперационного пребывания в стационаре снижалась при ОК до 6,1 дня по сравнению с 11,5 днями в группе без ОК ($p=0,006$)	КИ (ОК вместе со стандартным лечением по сравнению со стандартным лечением)	[87]
Операции с использованием срединной стернотомии	В опытной группе отмечалось более выраженное снижение интенсивности болевого синдрома по сравнению с контрольной группой ($p<0,05$). По данным УЗИ, на фоне ОК отмечено более выраженное ($p<0,05$) уменьшение объема жидкости в плевральных полостях с 420 мл до 50 мл ($p<0,01$), чем в контрольной группе (с 540 до 235 мл, $p<0,05$)	РКИ (ОК вместе со стандартным лечением по сравнению со стандартным лечением)	[88]
Болезни бронхолегочной системы			
Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ)	Работоспособность через 6 мин ходьбы улучшилась в обеих группах, в группе ОК+ЛР улучшение было статистически значимо большим ($p=0,04$). Только в группе ОК+ЛР наблюдалось увеличение объема форсированного выдоха за 1-ю секунду (ОФВ1)	РКИ [легочная реабилитация (ЛР) и ОК по сравнению со стандартной ЛР]	[89]
Пневмония	ОК является экономически эффективным вспомогательным лечением пневмонии, которое сокращает продолжительность пребывания пациентов в больнице и внутривенного введения антибиотиков, а также частоту дыхательной недостаточности. Группа ОК имела более низкую частоту дыхательной недостаточности, зависящую от аппарата ИВЛ, чем в группе стандартного лечения [0 из 40 (0 %) против 5 из 50 (10 %); $p=0,05$]. Дополнительная ОК снижает внутрибольничную смертность у взрослых 75 лет и старше	РКИ (ОК вместе со стандартным лечением по сравнению со стандартным лечением)	[90–92]
Хронический бронхит	В группе ОК положительная динамика показателей функции внешнего дыхания (экспираторная грудная клетка, $p<0,05$, форсированная жизненная емкость легких, $p<0,05$, пиковая скорость выдоха, $p<0,05$) по сравнению с контрольной группой. Увеличение экспираторной грудной клетки и пиковой скорости выдоха в группе ОК сохраняется и через 3 мес после завершения курса терапии, что позволяет сделать вывод о пролонгированном эффекте	РКИ (ОК вместе со стандартным лечением по сравнению со стандартным лечением)	[93]
Реабилитация после коронавирусной пневмонии COVID-19	После однократной процедуры ОК отмечено увеличение жизненной емкости легких (ЖЁЛ) с $78,2\pm 2,7$ до $85,3\pm 3,3\%$ ($p=0,0006$), среднего показателя насыщения гемоглобина артериальной крови кислородом SpO_2 с $94,2\pm 0,2$ до $95,0\pm 0,3\%$ ($p=0,02$)	Когортное исследование	[94]
	После курса реабилитации в группе ОК отмечено увеличение ЖЁЛ на 12,3 % ($p<0,0001$), ФЖЁЛ — на 12,1 % ($p<0,0001$), уровня SpO_2 (с $96,6\pm 0,2$ до $97,5\pm 0,2\%$, $p=0,0013$). У пациентов контрольной группы основные показатели функции внешнего дыхания также улучшились, но изменения были статистически не значимы	РКИ (ОК вместе со стандартным лечением по сравнению со стандартным лечением)	[95]

Продолжение

Заболевание	Результаты остеопатической коррекции (ОК)	Уровень доказательности	Библиографические ссылки
Абдоминальный болевой синдром после перенесенной плевропневмонии	В обеих группах было купирование абдоминальных болей эпигастральной локализации. Однако в контрольной группе причина данного синдрома не была устранена, что опасно рецидивами. ОК привела к значительному снижению показателей градиента давления в чревном стволе (через 2 нед на 43,8%, через 1 мес на 55,2%, $p<0,05$) и снижению скорости кровотока в чревном стволе (через 2 нед на 18,7%, через 1 мес на 31,1%, $p<0,05$), тогда как в контрольной группе эти показатели практически не изменились	РКИ (ОК по сравнению со стандартным лечением)	[96]
Болезни органа зрения			
Миопия легкой степени и спазм аккомодации у детей	В группе ОК произошло уменьшение тяжести миопии в среднем на 0,5 Дптр (в 59% случаев наступило уменьшение тяжести миопии, в 18% случаев — стабилизация процесса без изменения данных рефрактометрии, в 23% случаев — ухудшение состояния), в контрольной — увеличение тяжести на 1,0 Дптр (стабилизация заболевания наступила только в 18% случаев, ухудшение — в 82%, а улучшение состояния не наступило ни у кого). По данным УЗДГ сосудов головы и шеи, исходно у всех детей наблюдалась асимметрия кровотока в позвоночных артериях. После лечения в группе ОК симметрия кровотока восстановилась у 83% пациентов, в контрольной группе изменений не наблюдалось	РКИ (ОК вместе со стандартным лечением по сравнению со стандартным лечением)	[97–99]
Астигматизм у детей	В опытной группе детей в возрасте до 6 мес астигматизм после лечения уменьшился в 2,2 раза (с $2,31\pm0,76$ до $1,05\pm0,53$ Дптр, $p<0,05$), в контрольной группе изменение тоже произошло, но всего в 1,3 раза (с $2,25\pm0,74$ до $1,83\pm0,63$ Дптр, $p>0,05$)	РКИ (ОК вместе со стандартным лечением по сравнению со стандартным лечением)	[100]
Первичная открытоугольная глаукома	При неоперированной глаукоме IIA стадии в группе ОК отмечено достоверное снижение уровня внутриглазного давления ($p<0,05$) и показателей периметрии (MD, VFI), $p<0,05$. У пациентов контрольной группы достоверных изменений данных показателей получено не было. У пациентов с прооперированной глаукомой в группе ОК уменьшилась выраженность болевого синдрома ($p<0,05$), увеличились поля зрения ($p<0,05$) и толщина слоя нервных волокон сетчатки по данным оптической когерентной томографии ($p<0,05$)	РКИ (ОК вместе со стандартным лечением по сравнению со стандартным лечением)	[101, 102]
Болезни ЛОР-органов у детей			
Рецидивирующий острый средний отит	При 6-месячном наблюдении в группе ОК значительно уменьшилось количество эпизодов острого отита ($p=0,04$) и среднее количество безоперационных месяцев ($p=0,01$), увеличилась частота нормальных типов тимпанограмм ($p=0,02$) по сравнению с контрольной группой. Также было меньшее количество хирургических вмешательств (пациенты с ОК — 1; пациенты контрольной группы — 8; $p=0,03$)	РКИ (ОК вместе со стандартным лечением по сравнению со стандартным лечением)	[103]
Хронический аденоидит	В группе ОК было более выраженное уменьшение жалоб и состояния рото- и носоглотки по результатам эндоскопического обследования ($p<0,05$). Катамнестическая оценка результатов лечения показала, что включение остеопатической коррекции в комплексную терапию детей с хроническим аденоидитом позволяет добиться более продолжительной ремиссии ($p<0,05$)	РКИ (ОК вместе со стандартным лечением по сравнению со стандартным лечением)	[104]

Окончание

Заболевание	Результаты остеопатической коррекции (ОК)	Уровень доказательности	Библиографические ссылки
Невротические и поведенческие расстройства			
Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ)	ОК положительно связана с повышением точности ($p=0,04$) и скорости ($p=0,03$) выполнения теста Бьянкарди–Строппа для измерения зрительно-пространственного внимания. В группе ОК по сравнению с контрольной группой отмечали увеличение показателей кратковременной памяти ($p<0,05$) и изменение типа и свойств нервной системы (от слабой к стабильной). Применение ОК в дополнение к ЭЭГ-БОС-тренингам сопровождается уменьшением количества поведенческих отклонений ($p<0,05$), увеличением продолжительности удержания внимания ($p<0,05$)	РКИ (ОК вместе со стандартным лечением по сравнению со стандартным лечением)	[105–107]
Тревога и депрессия у детей с эпилепсией	После курса ОК у детей с идиопатической фокальной эпилепсией нормальная оценка тревоги увеличилась с 27 до 96 % ($p<0,01$). У детей с идиопатической генерализованной эпилепсией нормальная оценка тревоги увеличилась с 16 до 37 % ($p<0,05$), у детей с симптоматическими формами эпилепсии — с 46 до 62 % ($p<0,01$). После проведенного курса ОК 96% детей с идиопатической фокальной эпилепсией отметили нормальные значения депрессии ($p<0,01$), при идиопатической генерализованной эпилепсии — 84 % ($p<0,05$). Использовалась Госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS)	РКИ (ОК вместе со стандартным лечением по сравнению со стандартным лечением)	[108]
Тревога и депрессия при люмбалгии	В группе ОК по четырем шкалам из шести [ситуативной тревожности (СТ), депрессии, активности и настроения] получена высокая сила эффекта ($d>0,8$). По двум оставшимся шкалам получены значения, превышающие малую силу эффекта [шкала личностной тревожности (ЛТ), $d>0,2$] и среднюю (шкала самочувствия, $d>0,5$). В контрольной группе лишь две шкалы по своим значениям приближались к высоким показателям силы эффекта (активности, $d=0,71$; настроения, $d=0,77$); одна шкала (самочувствия) превышала средний уровень силы эффекта ($d=0,53$); три шкалы (СТ, ЛТ, депрессии) имели значения силы эффекта, чуть превышающие низкий уровень ($d>0,2$)	РКИ (ОК по сравнению со стандартным лечением)	[109]
Эмоциональная напряженность и астения при синдроме позвоночной артерии (СПА)	В группе ОК получена положительная динамика: уменьшение количества респондентов с высокой и средней степенью скрытой эмоциональной напряженности на 47,5 и 17,5% соответственно, увеличение количества пациентов с отсутствием скрытой эмоциональной напряженности на 65 % ($p<0,05$). В контрольной группе статистически значимых различий по результатам теста «Накопление эмоционально-энергетических зарядов, направленных на самого себя» (В.В. Бойко) получено не было. В группе ОК уменьшилось количество респондентов с сильной степенью астении на 32,5%, с умеренной астенией — на 35%. При этом возросло количество пациентов со слабой степенью астении и с отсутствием ее вообще — на 7,5 и на 60% соответственно ($p<0,05$). В контрольной группе достоверная позитивная динамика получена только по уменьшению количества пациентов с сильной степенью астении на 15%. Использовалась шкала астенического состояния (ШАС А.Д. Майкова, Т.Г. Чертова)	РКИ (ОК вместе со стандартным лечением по сравнению со стандартным лечением)	[110]

Приложение А3.3

Действие остеопатической коррекции на организм

Механизмы оздоровительного и лечебного действия ОК на организм активно изучаются, и основные из них подтверждены экспериментальными и клиническими исследованиями (рис. 4).



Рис. 4. Эффекты остеопатической коррекции

Эффекты остеопатической коррекции	Библиографические ссылки
Нормализация/уменьшение пальпаторно и визуально определяемого мышечного тонуса	[74, 111]
Уменьшение мышечного тонуса и улучшение кровоснабжения мышц по данным вибрационной вискоэластометрии	[112, 113]
Увеличение объема движений в суставах конечностей	[114, 115]
Увеличение объема движений в спине и шее	[116, 117]
Увеличение ширины открывания рта	[52]
Изменение плотности коллагеновых волокон и их ориентации в структуре матрикса, уменьшение количества поперечных сшивок в них, повышение гидратации матрикса	[118, 119]
Изменение качественного и количественного состава внеклеточного матрикса вследствие механически индуцированных изменений синтетической активности фибробластов	[4, 120]
Уменьшение уровня провоспалительных цитокинов и уменьшение периферической сенситизации	[121–124]

Окончание

Эффекты остеопатической коррекции	Библиографические ссылки
Снижение активности симпатического отдела и повышение активности парасимпатического отдела ВНС, восстановление вегетативного равновесия по данным анализа variability сердечного ритма	[125–128]
Повышение уровня окситоцина в плазме	[129]
Повышение уровня Р-эндорфинов, серотонина и эндогенных каннабиноидов	[130, 131]
Нормализация венозного давления (исходно повышенное снижалось, исходно пониженное повышалось)	[132]
Активация венозного возврата к сердцу за счет увеличения подвижности грудной клетки и присасывающего действия диафрагмы	[133]
Нормализация венозного оттока от головы	[111, 134]
Улучшение кровотока по позвоночным артериям, уменьшение асимметрии кровотока по данным УЗДГ	[74, 135, 136]
Улучшение микроциркуляции за счет выхода вазоактивных веществ из клеток соединительной ткани (оксида азота, простагландинов, гистамина и др.)	[137]
Улучшение лимфообразования и лимфотока	[138, 139]
Выход лейкоцитов из депо	[140]
Уменьшение количества внеклеточной жидкости по данным биоимпедансометрии	[141]
Уменьшение вязкости тканей по данным вибрационной вискоэластометрии	[142]

Эффекты ОК могут быть по степени выраженности локальными (в виде изменения коллоидного состояния, степени гидратации и структуры ткани), сегментарными (в виде рефлекторного ответа) или региональными (в виде улучшения кровоснабжения и лимфотока) и глобальными (в виде гормональных эффектов), могут возникать через различные промежутки времени после сеанса ОК — от нескольких минут до нескольких недель. Описанные эффекты ОК в целом увеличивают адаптационные резервы организма, его устойчивость к различным повреждающим факторам и стимулируют собственные процессы самокоррекции и самовосстановления.

Остеопатию отличает системный подход к лечению и реабилитации человека, доверие к адаптационным и компенсаторным резервам организма. Индивидуальный подход к пациенту позволяет улучшить адаптационные возможности его организма. Остеопатия не лечит заболевания, а способствует выздоровлению за счет ликвидации функциональных нарушений и улучшает качество жизни. Вследствие этого ОК может применяться на всех этапах оказания медицинской помощи населению (рис. 5).

ОК может применяться до, совместно или после фармакологического или хирургического лечения и усиливать терапевтический эффект, значительно сокращая при этом период реабилитации пациента и риск возникновения осложнений. Важным результатом ОК является уменьшение лекарственной нагрузки на организм пациента, а следовательно:

- снижение риска развития аллергических реакций;
- уменьшение побочных действий лекарственных препаратов;
- предотвращение развития полипрагмазии;
- уменьшение интоксикации.




Рис. 5. Место остеопатии в системе оказания медицинской помощи населению

Приложение А3.4

Форма вкладыша № 1 «Первичный осмотр врачом-osteопатом»

Приложение № 25 к приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 15 декабря 2014 г. № 834н

Форма вкладыша № 1

ПЕРВИЧНЫЙ ОСМОТР ВРАЧОМ-ОСТЕОПАТОМ

1. Дата заполнения: число _____ месяц _____ год _____ Время _____
2. Жалобы на момент обращения на:
 - ☐ нарушение функции опорно-двигательного аппарата
 - ☐ нарушение функции мочевыделительной и половой систем
 - ☐ нарушение функции органов желудочно-кишечного тракта
 - ☐ болевой синдром
 - ☐ нарушение функции сердечно-сосудистой системы
 - ☐ нарушение функции дыхательной системы
3. Соматический статус:
 - 3.1. Общее состояние: ☐ удовлетворительное ☐ средней тяжести ☐ тяжелое ☐ крайне тяжелое
 - 3.2. Тип телосложения: ☐ нормостенический ☐ гиперстенический ☐ астенический
 - 3.3. Кожные покровы: ☐ чистые ☐ высыпания ☐ влажные ☐ сухие ☐ экскориации
 - 3.4. Слизистая оболочка: ☐ чистая ☐ высыпания ☐ влажная ☐ сухая
 - 3.5. Дыхание: ☐ пуэрильное ☐ везикулярное ☐ жесткое ☐ ослабленное;
хрипы: ☐ нет ☐ влажные ☐ сухие
 - 3.6. АД _____ мм рт. ст.

- 3.7. Пульс на лучевых артериях _____ ударов в минуту;
☐ ритмичный ☐ аритмичный ☐ симметричный ☐ несимметричный ☐ напряжен ☐ не напряжен
- 3.8. Живот: ☐ мягкий ☐ напряжен ☐ доступен глубокой пальпации ☐ безболезненный
☐ болезненный при пальпации
- 3.9. Безусловные рефлексы (для детей первого года жизни):

☐ поисковый	☐ автоматической ходьбы	☐ Бабкина
☐ сосательный	☐ ползания по Бауэру	☐ Бабинского
☐ шейный тонический рефлекс	☐ подошвенный	☐ Моро
☐ хватательный		

- 3.10. Психомоторное развитие (для детей): ☐ соответствует возрасту ☐ не соответствует возрасту
 Для детей первого года жизни:

☐ удерживает голову	☐ ходит держась за одну руку
☐ лежа на животе опирается на предплечья	☐ самостоятельная ходьба
☐ переворачивается со спины на живот	☐ осознанная улыбка
☐ переворачивается с живота на спину	☐ различает «своих» и «чужих»
☐ берет игрушку в ручку	☐ отдельные звуки певуче
☐ присаживается	☐ фиксирует взгляд на предмете и следит за ним
☐ сидит	☐ произносит «агу»
☐ встает на четвереньки	☐ слоги певуче
☐ ползает	☐ основные слова-определения
☐ берет предметы в ручку и совершает простые действия с ними	☐ знает названия базовых предметов и по просьбе ищет их
☐ встает у опоры	☐ дополнительно:
☐ переступает у опоры	

4. Остеопатический статус

4.1. Общий осмотр

4.1.1. Оцениваемые параметры:	симметричность/ расположение на одном уровне	несимметрично/ расположение на разных уровнях
Спереди:	☐	☐
позиция головы	☐	☐
межзрачковая линия	☐	☐
положение ушных раковин	☐	☐
положение углов нижней челюсти	☐	☐
высота плеч, мышечные валики надплечий	☐	☐
уровень и симметричность ключиц	☐	☐
ротация и форма грудной клетки	☐	☐

экскурсия грудной клетки на спокойном дыхании	☐	☐
треугольники талии	☐	☐
позиция верхних конечностей	☐	☐
позиция пупка	☐	☐
положение гребней подвздошных костей	☐	☐
положение передневерхних подвздошных остей	☐	☐
ротация таза	☐	☐
положение нижних конечностей (наружная или внутренняя ротация, длина)	☐	☐
положение надколенников	☐	☐
своды стоп	☐	☐
Сзади:	☐	☐
позиция головы и шейного отдела позвоночника	☐	☐
уровень сосцевидных отростков	☐	☐
высота плеч, мышечные валики надплечий	☐	☐
уровень лопаток	☐	☐
позвоночник во фронтальной плоскости	☐	☐
треугольники талии	☐	☐
высота гребней подвздошных костей	☐	☐
положение задневерхних подвздошных остей	☐	☐
симметричность подъягодичных складок	☐	☐
ротация таза	☐	☐
опора на ногу	☐	☐
позиция пяток	☐	☐

4.1.2. Вертикаль Барре: ☐ есть отклонение ☐ нет отклонения

4.1.3. Изгибы позвоночника в сагиттальной плоскости:

шейный лордоз ☐ сохранен ☐ сглажен ☐ усилен

грудной кифоз ☐ сохранен ☐ сглажен ☐ усилен

поясничный лордоз ☐ сохранен ☐ сглажен ☐ усилен

4.2. Мышечный тонус: ☐ симметричный ☐ асимметричный

Дополнительно: _____

4.3. Активные тесты:

общая флексия ☐ не ограничена ограничена: ☐ в шейном ☐ в грудном
☐ в поясничном отделе

общая экстензия ☐ не ограничена ограничена: ☐ в шейном ☐ в грудном
☐ в поясничном отделе

латерофлексия вправо ☐ не ограничена ограничена: ☐ в шейном ☐ в грудном
☐ в поясничном отделе

латерофлексия влево ☐ не ограничена ограничена: ☐ в шейном ☐ в грудном
☐ в поясничном отделе

Дополнительно: _____

4.4. Тест флексии глобальный (для детей первого года жизни): ☐ ограничена ☐ не ограничена

4.5. Общее прослушивание: ☐ вперед ☐ назад ☐ вправо ☐ влево

Дополнительно: _____

4.6. Флексионный тест:

стоя: ☐ отрицательный ☐ положительный ☐ «+» ☐ «++» ☐ «+++» ☐ справа ☐ слева

сидя: ☐ отрицательный ☐ положительный ☐ «+» ☐ «++» ☐ «+++» ☐ справа ☐ слева

4.7. Оценка длины нижних конечностей в положении пациента лежа на спине:

☐ равная ☐ укорочение справа ☐ укорочение слева

4.8. Оценка ригидности суставов и окружающих мягких тканей:

4.8.1. Суставы нижних конечностей, таза:

Оцениваемые параметры:	есть ригидность и ограничение	нет ригидности и ограничения
крестцово-подвздошный	☐	☐
тазобедренный	☐	☐
коленный	☐	☐
голеностопный	☐	☐
подтаранный	☐	☐
ладьевидно-кубовидный	☐	☐
клиновидные кости	☐	☐
плюснефаланговые	☐	☐

4.8.2. Суставы пояса верхних конечностей и верхних конечностей:

Оцениваемые параметры:	есть ригидность и ограничение	нет ригидности и ограничения
грудино-ключичный	☐	☐
акромиально-ключичный	☐	☐
плечевой	☐	☐
локтевой	☐	☐
лучезапястный	☐	☐

4.9. Оценка трансляции:

таза ☐ не ограничена ☐ ограничена вправо ☐ ограничена влево

поясничного отдела ☐ не ограничена ☐ ограничена вправо ☐ ограничена влево

грудного отдела ☐ не ограничена ☐ ограничена вправо ☐ ограничена влево

шейного отдела ☐ не ограничена ☐ ограничена вправо ☐ ограничена влево

4.10. Оценка пассивной флексии и экстензии:

поясничный отдел ☐ нет ограничения ☐ ограничена флексия ☐ ограничена экстензия

грудной отдел ☐ нет ограничения ☐ ограничена флексия ☐ ограничена экстензия

4.11. Оценка смещаемости висцеральных масс в сагиттальной плоскости:

средний и нижний этаж брюшной полости ☐ не ограничена

☐ ограничена вентрально ☐ ограничена дорсально

верхний этаж брюшной полости ☐ не ограничена

☐ ограничена вентрально ☐ ограничена дорсально

грудной полости ☐ не ограничена

☐ ограничена вентрально ☐ ограничена дорсально

- 4.12. Оценка смещаемости висцеральных масс во фронтальной плоскости:
- средний и нижний этаж брюшной полости ☐ не ограничена
☐ ограничена вправо ☐ ограничена влево
- верхний этаж брюшной полости ☐ не ограничена
☐ ограничена вправо ☐ ограничена влево
- грудной полости ☐ не ограничена
☐ ограничена вправо ☐ ограничена влево
- висцеральное ложе шеи ☐ не ограничена
☐ ограничена вправо ☐ ограничена влево
- 4.13. Тест «трех сфер» (оценка для детей первого года жизни):
- объем головы и шейного отдела ☐ нет ограничения
☐ ограничен вентрально ☐ ограничен дорсально
- торакальный объем ☐ нет ограничения
☐ ограничен вентрально ☐ ограничен дорсально
- абдоминальный и тазовый объемы ☐ нет ограничения
☐ ограничен вентрально ☐ ограничен дорсально
- 4.14. Оценка мобильности грудной и брюшной полостей:
☐ нет ограничения ☐ ограничение грудной полости ☐ ограничение брюшной полости
- 4.15. Оценка ритмогенной составляющей:
- 4.15.1. Краниальный ритмический импульс: _____ в минуту; амплитуда _____; сила _____
- 4.15.2. Кардиальный ритмический импульс: _____ в минуту; амплитуда _____; сила _____
- 4.15.3. Торакальный ритмический импульс: _____ в минуту; амплитуда _____; сила _____
- 4.15.4. Пульс на лучевых артериях: симметричен ☐ да ☐ нет; ритмичен ☐ да ☐ нет
- 4.15.5. Пульс на задних большеберцовых артериях:
симметричен ☐ да ☐ нет; ритмичен ☐ да ☐ нет
- 4.16. Дополнительные остеопатические тесты: _____

5. Остеопатическое заключение.

Уровень/ Нарушение	Биомеханическое, баллы	Ритмогенное, баллы	Нейродинамическое*, баллы				
Глобальный	1 2 3	Краниальное 1 2 3 Кардиальное 1 2 3 Дыхательное 1 2 3	Психовисцеросоматическое 1 2 3 Постуральное 1 2 3				
Региональный	Область (регион):	Структуральная составляющая	Висцеральная составляющая	Висцеро-соматический компонент	Сомато-висцеральный компонент		
	Головы	1 2 3		Cr C1–C3 C4–C6 C7–Th1 Th2–Th5 Th6–Th9 Th10–L1 L2–L5	1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3		
	Шеи	1 2 3	1 2 3				
	Верхних конечностей	1 2 3					
	Грудной	1 2 3	1 2 3				
	Поясничный	1 2 3	1 2 3				
	Таза	1 2 3	1 2 3				
	Нижних конечностей	1 2 3					
	Твердой мозговой оболочки		1 2 3				
	Локальный	Указываются отдельные соматические дисфункции (острые или хронические):					
Доминирующая соматическая дисфункция:							

* Глобальное нейродинамическое нарушение у детей до 1 года не оценивается. Постуральное нарушение у детей оценивают с 12 лет.

6. Диагноз: Основное заболевание: _____ код по МКБ-10 _____
Осложнения: _____ код по МКБ-10 _____
Сопутствующие заболевания: _____ код по МКБ-10 _____
7. План лечения: _____
8. Листок нетрудоспособности, справка: _____
9. Рекомендации: _____
- 9.1. Консультации специалистов:
☐ невролога ☐ терапевта ☐ педиатра ☐ ортопеда ☐ офтальмолога ☐ стоматолога
- 9.2. Обследования:
☐ клинический анализ крови
☐ общий анализ мочи
☐ биохимический анализ крови _____
☐ рентгенография _____
☐ ультразвуковое исследование: _____
☐ МРТ: _____
☐ КТ: _____
Дополнительные методы исследования: _____
- 9.3. Медикаментозная терапия: _____
- 9.4. Дополнительные немедикаментозные методы лечения:
☐ лечебная физкультура ☐ массаж ☐ физиотерапия ☐ рефлексотерапия
- 9.5. Рекомендации по двигательному режиму: _____
- 9.6. Рекомендации по питанию: _____
- 9.7. Повторный осмотр через _____ дней
- Врач-osteopat: _____ (_____)

Приложение А3.5

Форма вкладыша № 2 «Осмотр врачом-osteопатом (наблюдение в динамике)»

Приложение № 27 к приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 15 декабря 2014 г. № 834н

Форма вкладыша № 2

ОСМОТР ВРАЧОМ-ОСТЕОПАТОМ (НАБЛЮДЕНИЕ В ДИНАМИКЕ)

1. Дата заполнения: число _____ месяц _____ год _____ Время _____
2. Жалобы на момент обращения на:
☐ нарушение функции опорно-двигательного аппарата
☐ нарушение функции органов желудочно-кишечного тракта
☐ нарушение функции сердечно-сосудистой системы
☐ нарушение функции дыхательной системы
☐ нарушение функции мочевыделительной и половой систем
☐ болевой синдром
Дополнительно: _____
3. Динамика на фоне проводимого лечения _____

4. Остеопатическое заключение.

Уровень/ Нарушение	Биомеханическое, баллы	Ритмогенное, баллы	Нейродинамическое*, баллы		
Глобальный	1 2 3	Краниальное 1 2 3 Кардиальное 1 2 3 Дыхательное 1 2 3	Психовисцеросоматическое 1 2 3 Постуральное 1 2 3		
Региональный	Область (регион):	Структуральная составляющая	Висцеральная составляющая	Висцеро-соматический компонент	Сомато-висцеральный компонент
	Головы	1 2 3		1 2 3	
	Шеи	1 2 3	1 2 3	Cr	
	Верхних конечностей	1 2 3		C1–C3	1 2 3
	Грудной	1 2 3	1 2 3	C4–C6	1 2 3
	Поясничный	1 2 3	1 2 3	C7–Th1	1 2 3
	Таза	1 2 3	1 2 3	Th2–Th5	1 2 3
	Нижних конечностей	1 2 3		Th6–Th9	1 2 3
	Твердой мозговой оболочки		1 2 3	Th10–L1	1 2 3
				L2–L5	1 2 3
Локальный	Указываются отдельные соматические дисфункции (острые или хронические):				
Доминирующая соматическая дисфункция:					

* Глобальное нейродинамическое нарушение у детей до 1 года не оценивается. Постуральное нарушение у детей оценивают с 12 лет.

5. План лечения: _____

6. Листок нетрудоспособности, справка: _____

7. Рекомендации: _____

7.1. Консультации специалистов:

☐ невролога ☐ терапевта ☐ педиатра ☐ ортопеда ☐ офтальмолога ☐ стоматолога

7.2. Обследования:

☐ клинический анализ крови
☐ общий анализ мочи
☐ биохимический анализ крови _____
☐ рентгенография _____
☐ ультразвуковое исследование: _____
☐ МРТ: _____
☐ КТ: _____

Дополнительные методы исследования: _____

7.3. Медикаментозная терапия: _____

7.4. Дополнительные немедикаментозные методы лечения:

☐ лечебная физкультура ☐ массаж ☐ физиотерапия ☐ рефлексотерапия

7.5. Рекомендации по двигательному режиму: _____

7.6. Рекомендации по питанию: _____

7.7. Повторный осмотр через _____ дней


Врач-остеопат: _____ (_____)

Приложение Б

Алгоритмы действий врача

Приложение Б1

Алгоритм действий врача



Приложение Б2

Алгоритм сбора жалоб

Жалоба	Требуемое уточнение
1. Система органов кровообращения	
Боль в области сердца	– локализация (в области верхушки сердца, за грудиной, слева от грудины); – характер (сжимающие, колющие, давящие, ноющие и т. д.); – интенсивность; – иррадиация; – продолжительность; – частота появления и причина (быстрая или медленная ходьба, другие физические нагрузки, волнение и т. д.); – поведение во время боли (старается ходить, прекращает движение, ложится в постель и т. д.); – появление чувства страха смерти, тоски, тревоги, повышенной потливости, повелительного мочеиспускания; – болеутоляющий эффект валидола, нитроглицерина, других средств
Сердцебиение	– частота и продолжительность; – время и условия возникновения (в покое, при волнении, при физической нагрузке, перемене положения тела, после приёма пищи, приступообразно без видимой причины); – когда и чем купируется
Перебои в работе сердца	характер (периодические, постоянные, беспорядочные, правильно чередующиеся); условия возникновения
Ощущение пульсации сосудов шеи, головы, других частей тела; похолодание конечностей	—
Одышка	условия возникновения (при физических нагрузках, в покое); длительность и характер (экспираторная, инспираторная, смешанная), степень выраженности
Отёки	локализация; распространённость (местные или типа анасарки); выраженность (пастозность, умеренные, значительные); изменения в течение суток; эффективность использования мочегонных средств
Боль в икроножных мышцах при ходьбе (перемежающая хромота)	—
2. Система органов дыхания	
Кашель	– интенсивность (незначительный, умеренный, сильный); – время появления, длительность (постоянный, периодический, приступообразный); – условия появления и купирования; – характер (сухой или влажный)
Мокрота	– количество отхаркиваемого содержимого одномоментно и за сутки; – характер (серозная, слизистая, слизисто-гнойная, гнойная); – запах; – примесь крови; – зависимость отхождения мокроты от положения пациента
Кровохарканье	– количество крови (прожилки крови в мокроте, равномерно окрашенные плевки, чистая кровь или сгустки); – цвет крови (алая, тёмная, «ржавая», слабо-розовая); условия появления и частота

Продолжение

Жалоба	Требуемое уточнение
Боль в грудной клетке	локализация, характер (острая, тупая, колющая, ноющая), интенсивность (слабая, умеренная, интенсивная), продолжительность (постоянная, приступообразная), иррадиация, связь с дыханием, кашлем, переменой положения тела
Удушье	– время и условия возникновения; частота и продолжительность; – затруднение вдоха или выдоха или того и другого; – поведение и положение пациента во время приступа удушья; купирование приступов; предвестники появления приступов
Лихорадка	– повышение температуры и пределы её колебаний в течение суток; – длительность лихорадочного периода; – ознобы; – потливость
Дыхание через нос	свободное или затруднённое
Выделения из носа	– характер, количество; – носовые кровотечения
Голос	обычный, сиплый, отсутствует (афония)
3. Система органов пищеварения	
Боль в животе	– локализация, интенсивность, характер (острая, тупая, ноющая, постоянная, схваткообразная, опоясывающая), иррадиация, длительность, периодичность, связь с приёмом пищи (сразу или вскоре после приёма пищи, через 1,5–2 ч, ночная боль, «голодная») и её качеством (после жирной, сладкой, солёной, мясной, горячей, холодной); – облегчение или купирование (особое положение тела, после приёма пищи, медикаментов, применения тепла, холода и т. д.)
Диспепсические явления	– затруднение глотания и прохождения пищи по пищеводу; – тошнота; – рвота; – отрыжка, изжога, вздутие живота; – степень выраженности диспепсических явлений, отношение к приёму пищи; – рвотные массы, количество, характер (кислая жидкость, рвота съеденной пищей, застойное содержимое), примесь желчи, крови (алой, тёмных сгустков, в виде «кофейной гущи»), запах (кислый, гнилостный, каловый, «тухлых яиц»), изменение самочувствия после рвоты
Аппетит	сохранён, понижен или отсутствует, повышен, извращён; отвращение к пище (жирной, мясной), насыщаемость (нормальная, быстрая)
Вкус во рту	обычный, притуплён, извращён; чувство жжения в языке
Слюноотделение	обычное, усиленное (слюнотечение), недостаточное (сухость во рту)
Жажда	уточняется количество выпиваемой жидкости в сутки
Стул	– самостоятельный, регулярный, нерегулярный, принудительный (после очистительной клизмы, слабительных средств); – запоры, поносы; – частота стула; – особенности каловых масс: количество, консистенция (оформленный, жидкий, кашицеобразный, водянистый, пенистый, твёрдый, «овечий»), цвет (коричневый, жёлто-коричневый, жёлтый, чёрный или дёгтеобразный, серо-белый или глинистый), запах (обычный, кислый, гнилостный, зловонный), примеси (слизь, гной, остатки непереваренной пищи, кровь), отхождение глистов; – болезненность при дефекации; жжение, зуд в области заднего прохода; – выпадение прямой кишки; – геморрой

Окончание

Жалоба	Требуемое уточнение
4. Система органов мочеотделения	
Боль	– локализация (в поясничной области, в низу живота), иррадиация; – характер боли (острая или тупая, постоянная или приступообразная); – условия возникновения (физическая нагрузка, изменение положения тела, приём острой пищи, алкоголя); – чем купируется
Отёки	локализация, распространённость, изменение в течение суток
Мочеиспускание	– частота, количество мочи за сутки (наличие полиурии, олигоурии, анурии); – странгурия; – дизурические явления
Моча	– цвет (соломенно-жёлтый, тёмный, цвета пива, «мясных помоев», красный); – прозрачность (прозрачная, мутная, наличие примесей крови, осадка); – запах (обычный, фруктовый, резкий, каловый)
5. Половая система	
Боль	– локализация (в низу живота, в паху, крестце, в области наружных половых органов); – характер; – иррадиация; – условия возникновения; – чем купируется
Менструации	регулярность, продолжительность, цикличность, количество менструальных отделений, болезненность; менопауза; особенности течения климактерического периода
Беременность (роды, аборты)	—
6. Нервная система и органы чувств	
Головная боль	локализация, характер, продолжительность, интенсивность, периодичность, чем купируется
Головокружение	частота, условия появления (при ходьбе, перемене положения тела, повороте головы, лёжа); тошнота при головокружении, шум в голове
Потеря сознания	частота, продолжительность, провоцирующие моменты; другие нарушения сознания
Сон	хороший, сонливость, бессонница, тревожный
Память	—
Настроение	ровное, спокойное, возбуждённое, подавленное, быстрая смена настроения, раздражительность, вспыльчивость
Двигательная сфера	слабость в конечностях, дрожание, судороги
Чувствительная сфера	кожная чувствительность (гипостезия, гиперестезия, парестезия, зуд кожи); зрение, обоняние, вкус, слух
7. Костно-мышечная система	
Боль	локализация (суставы, кости конечностей, позвоночник, мышцы, подошвенная часть стоп), характер, интенсивность, условия возникновения, продолжительность, периодичность, чем купируется
Отёчность, деформация, ограничения подвижности суставов	—
Масса тела (её изменения)	—

Алгоритм общего остеопатического осмотра

Этап	Исходное положение пациента	Действия врача	Комментарии
1 Осмотр спереди / сбоку / сзади	Стоя	Спереди врач оценивает: – позицию головы; – межзрачковую линию; – положение ушных раковин; – положение углов нижней челюсти; – высоту плеч, мышечные валики надплечий; – уровень и симметричность ключиц; – ротацию и форму грудной клетки; – экскурсию грудной клетки на спокойном дыхании; – треугольники талии; – позицию верхних конечностей (наружная или внутренняя ротация, сгибание в локтевых суставах); – позицию плеча; – положение гребней подвздошных костей; – положение передневерхних подвздошных остей (ПВПО); – ротацию таза; – положение нижних конечностей (наружная или внутренняя ротация, длина); – положение надколенников; – своды стоп; – состояние пальцев ног. Сбоку врач оценивает: – изгибы позвоночника в сагиттальной плоскости (шейный лордоз, грудной кифоз, поясничный лордоз); – оценка вертикали Барре (вертекс — наружный слуховой проход — бугристая плечевой кости — большой вертел бедренной кости — наружная лодыжка); – наклон таза. Сзади врач оценивает: – позицию головы и шейного отдела позвоночника; – уровень сосцевидных отростков; – высоту плеч, мышечные валики надплечий; – уровень лопаток (высота, разворот углов, отстояние от грудной клетки); – позвоночник во фронтальной плоскости; – треугольники талии; – высоту гребней подвздошных костей; – положение задневерхних подвздошных остей (ЗВПО);	—

			– симметричность подъягодичных складок; – ротацию таза; – опору на ногу (сгибание ноги, переразгибание ноги); – позицию пяток		
2	Пальпация, перкуссия мышечного тонуса	Стоя	Врач осуществляет пальпацию мышц и/или легкое симметричное постукивание по проекции мышц для оценки их тонуса, состояния. Сзади врач оценивает: – трапецевидную мышцу; – паравертебральные мышцы; – ягодичные мышцы; – мышцы задней поверхности бедра; – икроножные мышцы; – ахилловы сухожилия. Спереди врач оценивает: – большую грудную мышцу; – прямую мышцу живота; – Мышцы передней поверхности бедра; – мышцы передней поверхности голени	В норме не должно выявляться зон жесткости, а мышечный тонус справа и слева должен быть симметричным	
3	Г глобальные активные тесты: – флексия; – экстензия (с контролем); – латерофлексия вправо/влево	Стоя	Врач просит пациента из исходного положения стоя, ноги на ширине плеч, совершить наклоны: – вперед (флексия); при этом врач оценивает: последовательность включения сегментов позвоночника сверху вниз, образование плавного кифоза, наличие ротации и/или латерофлексии при флексии, наличие сколиотических дуг; – назад (экстензия); врач обязательно поддерживает пациента; оценивает включение сегментов позвоночника снизу вверх, образование плавного лордоза; – в стороны (латерофлексия); врач оценивает включение сегментов в движение, образование дуг, наличие ротации	—	
4	Глобальное остеопатическое прослушивание	Исходное положение пациента стоя, расстояние между пятками равно ширине стопы врача. Голова находится в нейтральном положении, пациент смотрит прямо перед собой (можно непосредственно указать точку впереди на расстоянии ~3 м от глаз)	Врач просит пациента закрыть глаза, после этого кладет руку и прослушивает ладонью с головы пациента глобальные зоны напряжения, ограничения подвижности. Следует отметить, что время прослушивания не должно превышать 3–4 с. Дополнительно оцениваются изменения, происходящие в теле при вдохе и выдохе	Если выявленная «зона напряжения» сохраняется во всех трех положениях (нейтральное положение, положение вдоха и выдоха), то она является первичной. Если «зона напряжения» исчезает хотя бы в одном из указанных положений, то речь уже идет о каких-то компенсаторных реакциях	

Продолжение

Этап	Исходное положение пациента	Действия врача	Комментарии
5 Флекссионный тест стоя (с разгрузкой задней группы мышц бедра при необходимости)	Исходное положение пациента стоя, ноги выпрямлены в коленных суставах, расстояние между стопами равно примерно ширине стопы пациента	Исходное положение врача: позади пациента, уровень глаз на уровне тестируемого участка. Большие пальцы врач устанавливает под задневерхние ости подвздошных костей (ЗВПО) с двух сторон. Врач просит пациента наклонить туловище вперед как можно ниже, начиная с шейного отдела, руки при этом свободно висят. Исследование повторяют 3 раза или при однократном исследовании врач наблюдает за положением ЗВПО в позе наклона не менее 10 с. Это позволяет установить удельный вес суставного и мышечного компонентов в формировании феномена опережения ЗВПО. При преобладании мышечного компонента, ЗВПО постепенно опускаются, а при преобладании суставного — сохраняют более высокое положение	Если при выполнении теста соотношение ЗВПО не меняется, то тест считается отрицательным. Если одна из ЗВПО поднимается выше другой, то флекссионный тест с этой стороны расценивается как положительный. Это значит, что имеется дисфункция, тип которой врач должен определить после выполнения второй части теста — в положении пациента сидя. При получении положительного теста также необходимо обратить внимание на тонус ишиокруральной группы мышц. Если он выше на стороне, с которой ЗВПО не поднималась или поднималась меньше при выполнении флекссионного теста стоя, то необходимо выполнить технику разгрузки ишиокруральной группы мышц бедра. Врач просит пациента выставить «рабочую» ногу (там, где мы хотим разгрузить ишиокруральную группу мышц) вперед и поставить ее на пятку. После этого пациент несколько раз пытается достать кончиками пальцев рук пальцев стоп (по возможности с прямой спиной). После выполнения разгрузки ишиокруральной группы мышц флекссионный тест стоя повторяют. Если результаты его изменились, то для дальнейшей интерпретации используется второй результат
6 Флекссионный тест сидя	Исходное положение пациента сидя, опора на стопы, ноги согнуты под прямым углом в коленных и тазобедренных суставах, колени разведены так, чтобы между ними прошли плечи пациента при наклоне	Исходное положение врача: позади пациента, уровень глаз на уровне тестируемого участка. Большие пальцы врач ставит под ЗВПО с двух сторон. Врач просит наклониться, руки между колен, максимально вниз. Если при тесте соотношение ЗВПО не меняется, то тест считается отрицательным. Если одна из ЗВПО поднимается выше другой, то тест считается положительным с той стороны, с которой и происходит смещение вверх ЗВПО	Интерпретация флекссионного теста стоя и сидя. Более выраженное цефалическое смещение ЗВПО при выполнении теста стоя и отсутствие нарушения соотношения ЗВПО при выполнении теста сидя указывают на восходящий тип дисфункции, то есть дисфункцию, исходящую от подвздошной кости, лонного сочленения или нижней конечности на стороне «убегания». Более выраженное цефалическое смещение ЗВПО при выполнении флекссионного теста сидя и отсутствие нарушений соотношения ЗВПО при

			выполнении теста стоя указывают на нисходящий тип дисфункции, то есть дисфункцию, исходящую от позвоночника, крестца. Цефалическое смещение ЗВПО при выполнении флекссионного теста стоя и сидя с одной стороны указывает на нисходящий тип дисфункции на одноименной стороне, при этом сидя должен быть больший дисбаланс, чем стоя. Более выраженное цефалическое смещение ЗВПО с одной стороны при выполнении флекссионного теста стоя, а при выполнении теста сидя — с другой стороны, указывает на восходящий тип дисфункции с одноименной стороны при тесте стоя и нисходящий тип дисфункции с одноименной стороны при тесте сидя	В норме не должно выявляться ограничения подвижности, и трансляция вправо и влево должна быть симметрична
7	Пассивные тесты в трансляции для таза, поясничного и грудного отделов позвоночника	Сидя с опорой нижних конечностей	Исходное положение врача: сбоку или позади пациента. Врач проводит глобальную оценку подвижности таза и позвоночника в трансляции вправо и влево	В норме дорсовентральное (флексия-экстензия) смещение (подвижность) как структурального, так и висцерального компонента должно быть симметричным и свободным
8	Тест «трех объемов»: – нижеабдоминальный; – поддиафрагмальный; – торакальный	Сидя с опорой нижних конечностей	Исходное положение врача: стоя позади пациента. Для оценки нижеабдоминального объема врач кладет одну руку продольно на нижний отдел передней брюшной стенки по средней линии. Вторую руку устанавливает дорсально на уровне нижепоясничного отдела позвоночника и крестца (L_{III-V} – S_{I-II}) в проекции первой. Врач активно проводит смещение захваченного объема в вентральном и дорсальном направлениях. Оценивается смещение дорсально (флексия) и вентрально (экстензия) структурального (поясничного отдела позвоночника) и висцерального (органы нижнего этажа брюшной полости) компонентов этого объема для выявления ограничения подвижности, ригидности. Для оценки поддиафрагмального объема врач кладет одну руку продольно на верхний отдел передней брюшной стенки по средней линии (основание лопатки) на уровне мечевидного отростка грудины). Вторая рука устанавливается дорсально на уровне нижегрудного-верхнепоясничного отделов позвоночника (Th_{X-XII} – L_{I-II}) в проекции первой. Врач активно проводит смещение захваченного объема в вентральном и дорсальном направлениях. Оценивается смещение дорсально (флексия) и вентрально (экстензия) структурального (нижнегрудной и верхнепоясничной	

Продолжение

Этап	Исходное положение пациента	Действия врача	Комментарии	
		отделы позвоночника) и висцерального (органы верхнего этажа брюшной полости, диафрагма) компонентов этого объема для выявления ограничения подвижности, ригидности. Для оценки торакального объема врач кладет одну руку продольно на передней поверхности грудной клетки по средней линии (основание ладони на уровне яремной вырезки грудной клетки). Вторая рука устанавливается дорсально на уровне верхнегрудного и среднегрудного отделов позвоночника (Th_{IV-VI}) в проекции первой. Дополнительно, при необходимости, врач создает точку фиксации на голове пациента своим плечом или головой. Врач активно проводит смещение захваченного объема в вентральном и дорсальном направлениях. Оценивается смещение дорсально (флексия) и вентрально (экстензия) структурального (верхнегрудной и среднегрудной отделов позвоночника) и висцерального (органы грудной полости) компонентов этого объема для выявления ограничения подвижности, ригидности		
9	Оценка длины нижних конечностей (с предварительным уравниванием таза)	Лежа на спине	Исходное положение врача: сбоку лицом к пациенту. Перед оценкой необходимо выполнить уравнивание таза. Для этого врач сгибает ноги пациента в коленных и тазобедренных суставах, приводит их к животу, затем устанавливает стопы на стол и просит пациента поднять таз для его уравнивания. После этого врач распрямляет ноги пациента (стопы скользят по столу) и уже производит оценку длины, устанавливая «вилку» II и III пальцев рук дистальнее лодыжек. При обследовании следует обратить внимание, чтобы ось стопы была перпендикулярна поверхности стола, а средняя линия стопы продолжалась в среднюю линию голени	В норме длина правой и левой нижних конечностей равна, то есть «вилка» II и III пальцев рук врача при выполнении теста находится на одном уровне
10	Тест ригидности суставов нижних конечностей («экспресс-диагностика дисфункции нижних конечностей»)	Лежа на спине	Исходное положение врача: стоя лицом к пациенту со стороны ногного конца. Врач двумя руками производит последовательную симметричную пальпаторную оценку состояния тканей и подвижности суставов нижних конечностей — тазобедренных, коленных, голеностопных, подтаранных, ладьевидно-кубовидных, проверяет движение клиновидных и плюсневых костей. Оцениваются глобальная жесткость (ригидность), подвижность суставов и окружающих тканей	В норме не должно выявляться зон ригидности, а амплитуда подвижности в суставах справа и слева должна быть симметричной

11	Тест ригидности крестцово-подвздошных суставов через SIAS	Лежа на спине	Исходное положение врача: стоя сбоку от пациента, лицом к головному концу. Врач устанавливает руки на подвздошные кости пациента таким образом, что основание ладони приходится на ПВПО. Далее врач производит последовательное симметричное смещение подвздошных костей в дорсальном направлении. Оцениваются глобальная жесткость, подвижность крестцово-подвздошных суставов (КПС) и окружающих тканей	В норме не должно выявляться зон ригидности, а амплитуда подвижности в правом и левом КПС должна быть симметричной
12	Тест ригидности суставов верхней конечности	Лежа на спине	Исходное положение врача: стоя сбоку от пациента, лицом к головному концу. Врач двумя руками производит последовательную симметричную пальпаторную оценку состояния тканей и подвижности суставов плечевого пояса и верхних конечностей: грудино-ключичных, акромиально-ключичных, плечевых, локтевых, лучезапястных. Для грудино-ключичного, акромиально-ключичного и плечевого суставов производится ритмичная симметричная пальпация в дорсальном направлении; для локтевого сустава производится пальпация сустава с оценкой жесткости, податливости и амплитуды движения; для лучезапястного сустава производится оценка флексии, экстензии сустава. Оцениваются глобальная жесткость (ригидность), подвижность суставов и окружающих тканей	В норме не должно выявляться зон ригидности, а амплитуда подвижности в суставах справа и слева должна быть симметричной
13	Тест шейного отдела позвоночника в трансляции	Лежа на спине	Исходное положение врача: сидя со стороны головы пациента. Врач устанавливает указательные пальцы в проекции поперечных отростков шейных позвонков (C_{II-VII}) и производит последовательное латеральное смещение (трансляцию) попеременно каждого позвонка. При этом оценивается амплитуда движения каждого позвонка. При оценке C_{0-I} врач ладонями в виде чаши захватывает затылок, первые пальцы — над ушами, локти лежат на столе. Врач оценивает свободу боковой трансляции (совокупное движение латерофлексии в одну сторону и ротации в противоположную) вправо–влево от центральной линии из нейтрального положения C_{0-I}	В норме трансляция шейных позвонков вправо и влево должна быть симметрична (равно амплитудна)
14	Оценка торакального и абдоминального регионов на споконном и форсированном входе и выходе	Лежа на спине	Исходное положение врача: стоя сбоку лицом к пациенту. Врач кладет одну руку продольно по средней линии на переднюю брюшную стенку. Другая рука устанавливается продольно по средней линии на передней поверхности грудной клетки. Оценивается глобальное изменение данных регионов, синхронность и симметричность этого процесса, наличие латеральных смещений (тяг), ротации при спокойном и форсированном дыхании (вход и выход)	—

Окончание

Этап	Исходное положение пациента	Действия врача	Комментарии
15 Оценка мобильности висцеральных масс (оценивается глобальная подвижность): – абдоминальных висцеральных масс; – торакальных висцеральных масс; – висцеральное ложе шеи	Лежа на спине	Исходное положение врача: стоя сбоку лицом к пациенту. Для оценки мобильности абдоминальных висцеральных масс среднего и нижнего этажа брюшной полости врач укладывает свои ладони на переднебоковую поверхность передней брюшной стенки пациента. Далее врач производит последовательное аккуратное латерально-латеральное (вправо–влево) смещение абдоминальных висцеральных масс, оценивая их глобальную подвижность. Для оценки мобильности абдоминальных висцеральных масс верхнего этажа брюшной полости врач укладывает свои руки на переднебоковую поверхность нижнего отдела грудной клетки (реберная дуга) справа и слева таким образом, что первые пальцы располагаются параллельно грудине, а среднеключичная линия приходится на первый межпальцевый промежутки. Далее врач производит последовательное аккуратное латерально-латеральное (вправо–влево) смещение висцеральных масс верхнего этажа брюшной полости, оценивая их глобальную подвижность. Для оценки мобильности торакальных висцеральных масс врач укладывает свои руки на переднебоковую поверхность верхнего отдела грудной клетки справа и слева таким образом, что первые пальцы располагаются параллельно грудине, а среднеключичная линия приходится на первый межпальцевый промежутки. Далее врач производит последовательное аккуратное латерально-латеральное (вправо–влево) смещение торакальных висцеральных масс, оценивая их глобальную подвижность. Оценка мобильности висцерального ложа шеи. Каудальной рукой в виде чаши врач захватывает висцеральное ложе шеи. Цефалическая рука захватывает лобную кость и является опорной. Далее врач производит последовательное аккуратное латерально-латеральное (вправо–влево) смещение висцерального ложа шеи, оценивая его глобальную подвижность	В норме мобильность висцеральных масс (их латеролатеральное смещение) должна быть симметричной
16 Оценка краниального ритмического импульса,	Лежа на спине или на боку	Оценка синхронности Исходное положение пациента: лежа на спине или на боку. Исходное положение врача: стоя или сидя лицом к пациенту. Руки врача укладываются одна под затылочную кость паци-	В норме движения затылочной кости и крестца должны быть симметричными

	паттерна черепа. Оцениваются синхронность, ритм, амплитуда и сила краниального ритмического импульса		ента, другая — под крестец. Врач производит оценку синхронности движения затылочной кости и крестца Оценка ритма, амплитуды и силы краниального импульса, паттерна черепа Исходное положение врача: сидя со стороны головы пациента. Врач производит захват черепа по Сатерленду, синхронизируется с краниальным ритмическим импульсом. Оценивается частота, амплитуда и сила краниального ритмического импульса, определяется паттерн черепа (физиологический или патологический)	В норме частота краниального ритмического импульса 8–12 в мин, амплитуда (+++), сила (+++)
17	Оценка дыхательного ритмического импульса	Лежа на спине	Оценка ритма, амплитуды и силы для верхнего и нижнего отделов грудной клетки Исходное положение врача: стоя сбоку лицом к пациенту. Для оценки верхнего отдела грудной клетки врач помещает руки продольно на переднюю поверхность грудной клетки справа и слева так, чтобы кончики пальцев оказались в подключичном пространстве. Для оценки нижнего отдела груди врача устанавливаются на переднебоковые поверхности грудной клетки справа и слева таким образом, что первые пальцы располагаются параллельно груди, а среднеключичная линия приходится на первый межпальцевый промежуток	В норме ритм 16–18 в мин (у взрослого человека), амплитуда (+++), сила (+++), симметрично проводится справа и слева
18	Оценка сердечного ритмического импульса, пальпаторное исследование артериального пульса на лучевых и задних большеберцовых артериях	Лежа на спине	Оценка сердечного ритмического импульса Исходное положение врача: стоя слева от пациента на уровне грудной клетки, лицом к голове. Врач кладет свою левую ладонь на переднюю поверхность грудной клетки слева, по оси сердца и определяет частоту, амплитуду и силу сердечного ритма Пальпаторное исследование артериального пульса на лучевых артериях Кисть пациента свободно захватывают рукой в области лучезапястного сустава так, чтобы большой палец находился на тыльной стороне предплечья, а остальные — на внутренней его поверхности. Насупав артерию II, III, IV пальцами, прижимает ее к подлежащей кости. Оценивается симметричность пульса, его частота, ритмичность Пальпаторное исследование артериального пульса на задних большеберцовых артериях Пальпация производится в межмышечковом желобке за внутренней лодыжкой. Оценивается его наличие, ритмичность и симметричность	В норме частота сердечного ритма 60–80 уд/мин (у взрослого человека), амплитуда (+++), сила (+++) В норме пульс на лучевой артерии пальпируется, ритмичный, частота 60–80 уд/мин (у взрослого человека), симметричный справа и слева В норме пульс на задней большеберцовой артерии пальпируется, симметричный справа и слева

Приложение Б4.

**Дополнительные тесты, проводимые при общем остеопатическом осмотре ребенка
(дополнительно к Приложению Б3. Алгоритм общего остеопатического осмотра)**

Этап	Исходное положение пациента	Действия врача	Комментарии
1 Тест «трёх сфер» (по Роберу Руссу) У детей до года под сферами нужно понимать: 1) объем головы и шейного отдела; 2) торакальный объем; 3) абдоминальный и тазовый объемы	Лежа или сидя	Исходное положение врача: стоя позади пациента. Для оценки первой сферы врач захватывает голову и шею латерально с двух сторон. Врач активно проводит смещение захваченного объема в вентральном и дорсальном направлениях. Оценивается смещение дорсально (флексия) и вентрально (экстензия) компонентов этого объема для выявления ограничения подвижности, ригидности. Для оценки второй сферы врач кладет одну руку продольно либо поперечно на передней поверхности грудной клетки. Вторая рука устанавливается дорсально продольно или поперечно в проекции первой руки. Врач активно проводит смещение захваченного объема в вентральном и дорсальном направлениях. Оценивается смещение дорсально (флексия) и вентрально (экстензия) структурального и висцерального (органы грудной полости) компонентов этого объема для выявления ограничения подвижности, ригидности. Для оценки третьей сферы врач кладет одну руку продольно или поперечно на переднюю брюшную стенку. Вторая рука устанавливается дорсально на уровне нижнегрудного и поясничного отделов позвоночника в проекции первой. Врач активно проводит смещение захваченного объема в вентральном и дорсальном направлениях. Оценивается смещение дорсально (флексия) и вентрально (экстензия) структурального и висцерального компонентов этого объема для выявления ограничения подвижности, ригидности	В норме дорсовентральное (флексия–экстензия) смещение (подвижность) как структурального, так и висцерального компонента должно быть свободным и симметричным
2 Тест флексии (глобальный)	Лежа на спине	Положение врача: лицом к пациенту. Тест: врач производит флексию выпрямленных нижних конечностей по направлению к голове. Оценка: степень свободы движения во флексии	В норме не должно выявляться значительного сопротивления и ограничения оцениваемого движения

Приложение В

Информация для пациента

Соматические дисфункции — это обратимые нарушения подвижности, иннервации и кровоснабжения тканей, которые могут быть как самостоятельным явлением, так и сопровождать самые разные заболевания. В ряде случаев соматические дисфункции предшествуют развитию того или иного заболевания, являясь дополнительным провоцирующим фактором.

Диагностика соматических дисфункций является компетенцией врача-остеопата и осуществляется посредством мануальной диагностики — проведения клинического остеопатического обследования. По результатам осмотра заполняется унифицированное остеопатическое заключение, которое отражает те дисфункции, которые были выявлены у данного конкретного пациента.

Продолжительность приема у врача-остеопата в среднем составляет около 45 мин. При необходимости врач может увеличить или сократить длительность приема в зависимости от потребности лечения и состояния пациента. Во время приема пациенту необходимо раздеться до белья. Если при этом Вы испытываете дискомфорт, стоит принести с собой одежду из мягкого тонкого материала, чтобы переодеться.

Подход к каждому пациенту персонифицированный и основывается на результатах предшествующей остеопатической диагностики. Интервал между приемами может быть от 3–5 дней в случае острой ситуации и от 10–14 дней до нескольких месяцев — в случае хронического процесса.

После приема врача-остеопата в течение 2–3 дней стоит избегать интенсивных физических нагрузок, обеспечить адекватный питьевой режим (в соответствии с возрастом, двигательной активностью и имеющимися хроническими заболеваниями).

Приложение Г1–ГN

Шкалы оценки, вопросники и другие оценочные инструменты состояния пациента, приведенные в клинических рекомендациях

Не предусмотрены.

Сведения об авторах:

Дмитрий Евгеньевич Мохов, докт. мед. наук, Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова, директор Института остеопатии и интегративной медицины; Санкт-Петербургский государственный университет, директор Института остеопатии
eLibrary SPIN: 8834-9914
ORCID ID: 0000-0002-8588-1577
Scopus Author ID: 55135855300

Владимир Олегович Белаш, канд. мед. наук, Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова, доцент кафедры остеопатии
eLibrary SPIN: 2759-1560
ORCID ID: 0000-0002-9860-777X
Scopus Author ID: 25959884100

Information about authors:

Dmitry E. Mokhov, Dr. Sci. (Med.), Mechnikov North-West State Medical University, Director of the Institute of Osteopathy and Integrative Medicine; Saint-Petersburg State University, Director of the Institute of Osteopathy
eLibrary SPIN: 8834-9914
ORCID ID: 0000-0002-8588-1577
Scopus Author ID: 55135855300

Vladimir O. Belash, Cand. Sci. (Med.), Mechnikov North-West State Medical University, Associate Professor at Osteopathy Department
ORCID ID: 0000-0002-9860-777X
Scopus Author ID: 25959884100

Игорь Александрович Аптекар, канд. мед. наук,
Тюменский институт мануальной медицины,
директор; Тюменский институт остеопатической
медицины, директор

Эльвира Николаевна Ненашкина,
Санкт-Петербургский государственный университет,
ассистент Института остеопатии
eLibrary SPIN: 1083-6912

Юлия Павловна Потехина, докт. мед. наук,
профессор, Приволжский исследовательский
медицинский университет, профессор кафедры
нормальной физиологии им. Н.Ю. Беленкова;
Институт остеопатии (Санкт-Петербург), заместитель
директора по научно-методической работе
eLibrary SPIN: 8160-4052
ORCID ID: 0000-0001-8674-5633
Scopus Author ID: 55318321700

Елена Сергеевна Трегубова, докт. мед. наук,
Северо-Западный государственный медицинский
университет им. И.И. Мечникова, профессор
Института остеопатии и интегративной медицины;
Санкт-Петербургский государственный университет,
профессор Института остеопатии
eLibrary SPIN: 2508-8024
ORCID ID: 0000-0003-2986-7698
Researcher ID I-3884-2015
Scopus Author ID: 7801407959

Анатолий Федорович Беляев, профессор,
докт. мед. наук, заслуженный врач России,
Тихоокеанский государственный медицинский
университет, профессор Института клинической
неврологии и реабилитационной медицины;
Приморский институт вертеброневрологии
и мануальной медицины (Владивосток), директор
eLibrary SPIN: 7144-4831
ORCID ID: 0000-0003-0696-9966
Scopus Author ID: 3461044

Igor A. Aptekar, Cand. Sci. (Med.),
Tyumen Institute of Manual Medicine,
General Manager; Tyumen Institute of Osteopathic
Medicine, General Manager

Elvira N. Nenashkina,
Saint-Petersburg State University,
Assistant at the Institute of Osteopathy
eLibrary SPIN: 1083-6912

Yulia P. Potekhina, Dr. Sci. (Med.), Professor,
Privolzhsky Research Medical University,
Professor at the N.Yu. Belenkov Department of Normal
Physiology; Institute of Osteopathy (Saint-Petersburg),
Deputy Director for Scientific and Methodological Work
eLibrary SPIN: 8160-4052
ORCID ID: 0000-0001-8674-5633
Scopus Author ID: 55318321700

Elena S. Tregubova, Dr. Sci. (Med.),
Mechnikov North-West State Medical University,
Professor at the Institute of Osteopathy and Integrative
Medicine; Saint-Petersburg State University, Professor
of the Institute of Osteopathy
eLibrary SPIN: 2508-8024
ORCID ID: 0000-0003-2986-7698
Researcher ID I-3884-2015
Scopus Author ID: 7801407959

Anatoly F. Belyaev, Professor, Dr. Sci. (Med.),
Honored doctor of the Russian Federation,
Pacific State Medical University, Professor of Institute
of Clinical Neurology and Rehabilitation Medicine;
Primorsky Institute of Vertebro-neurology and Manual
Medicine (Vladivostok), Director
eLibrary SPIN: 7144-4831
ORCID ID: 0000-0003-0696-9966
Scopus Author ID: 3461044